

## COMUNICATO FITOSANITARIO

valido dal 03 al 09 Gennaio 2012

**VITE****FASE FENOLOGICA:** riposo vegetativo.**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** esiti di avversità parassitarie.**PROGRAMMA DI DIFESA:** durante le operazioni di potatura, si raccomanda di intervenire separatamente sulle piante affette da mal dell'esca segnalate durante il periodo vegetativo, asportando tutto il legno infetto ed eliminando le piante non più risanabili. Tutto il materiale di risulta, dovrà essere allontanato dal campo e distrutto; inoltre, gli attrezzi utilizzati per la potatura devono essere disinfettati con ipoclorito di sodio (candeggina) al 1%, prima di intervenire sulle piante sane.**OLIVO****FASE FENOLOGICA:** maturazione**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** presenza di rodilegno giallo, infezioni di occhio di pavone, cercosporiosi e mosca. In aumento le infezioni di lebbra.**PROGRAMMA DI DIFESA:** Contro le crittogame dell'olivo, limitatamente agli impianti dove la raccolta risulta completata, effettuare un trattamento in condizioni di stabilità climatica, con un prodotto a base di rame.

Si consiglia di anticipare la raccolta mediante l'uso di scuotitori, per limitare i danni causati dalla mosca.

Si ricorda, inoltre, di rimuovere dai tronchi delle giovani piante, le fasce di resinato applicate per la cattura dell'oziorrinco, in quanto l'umidità e le basse temperature invernali potrebbero determinare danni alla corteccia sottostante.

**AGRUMI****FASE FENOLOGICA:** maturazione**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** *Aleurocanthus spiniferus*.**PROGRAMMA DI DIFESA:** nessun trattamento.Solo per il controllo di *Aleurocanthus spiniferus* (**parassita da quarantena**), dove è stata accertata la presenza, si può intervenire impiegando, oltre l'olio minerale, anche sostanze attive registrate sulla coltura per il controllo degli aleurodidi come, flonicamid, thiamethoxam, acetamiprid, pyriproxifen ecc. Al fine di evitare la diffusione del parassita in aree indenni, si ricorda il divieto assoluto di portare fuori dal campo, materiale vegetale infestato dall'insetto e di commercializzare frutti con foglie o parti vegetali infestate. E' indispensabile, inoltre, spazzolare gli indumenti o altro materiale portato a contatto con le piante infestate.

Per le cultivar prossime alla raccolta, non utilizzare olio minerale bianco, in quanto interferisce sulla colorazione dei frutti.

**N.B. :** Si raccomanda di rispettare scrupolosamente il tempo di carenza degli agrofarmaci eventualmente utilizzati.