

COMUNICATO FITOSANITARIO

valido dal 27 Marzo al 02 Aprile 2012

**VITE****FASE FENOLOGICA:** gemma cotonosa - inizio germogliamento.**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** esiti di avversità parassitarie.**PROGRAMMA DI DIFESA:** nessun trattamento.**OLIVO****FASE FENOLOGICA:** inizio germogliamento**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** presenza di insetti lignicoli, infezioni di occhio di pavone, cercosporiosi e lebbra.**PROGRAMMA DI DIFESA:** per il controllo delle principali crittogame, dove la raccolta è già stata completata, effettuare un trattamento, in condizioni di stabilità climatica, con un prodotto a base di rame. Si consiglia di rimuovere dai tronchi delle giovani piante le fasce di resinato applicate per la cattura dell'oziorrinco, in quanto l'umidità e le basse temperature invernali potrebbero determinare danni alla corteccia sottostante. Durante le operazioni di potatura, asportare tutte le parti che presentano esiti di attacchi parassitari. Si raccomanda, inoltre, di assicurare un buon arieggiamento della chioma, in modo tale da consentire alla pianta migliori condizioni vegetative e al tempo stesso evitare un eccessivo ombreggiamento che potrebbe favorire lo sviluppo di crittogame e cocciniglie. Negli oliveti che hanno subito attacchi di fleotribo, si consiglia di lasciare sotto le piante alcuni rami della potatura che serviranno da esca per gli accoppiamenti e le ovideposizioni dell'insetto. I rami esca andranno poi eliminati, entro la fine di aprile, prima dello sfarfallamento della nuova generazione.**AGRUMI****FASE FENOLOGICA:** ripresa vegetativa - allungamento germogli prima fase.**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** forme svernanti di avversità parassitarie.**PROGRAMMA DI DIFESA:** durante le operazioni di potatura, eliminare le parti di chioma interessate da attacchi parassitari, assicurando un buon arieggiamento della pianta.**N.B. :** Si raccomanda di rispettare scrupolosamente il tempo di carenza degli agrofarmaci eventualmente utilizzati.