

COMUNICATO FITOSANITARIO

valido dal 15 al 21 maggio 2012

VITE**FASE FENOLOGICA:** bottoni fiorali separati - inizio fioritura**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** nessun problema fitosanitario.**PROGRAMMA DI DIFESA:** subito prima della fioritura si consiglia un trattamento cautelativo per il controllo della peronospora e dell'oidio impiegando prodotti endoterapici di più lunga persistenza, in considerazione anche dell'attuale variabilità climatica. Garantire una bagnatura uniforme della vegetazione e rispettare il dosaggio per ettaro dei prodotti impiegati. Durante la fioritura non effettuare trattamenti antiparassitari.OLIVO**FASE FENOLOGICA:** mignolatura - inizio fioritura**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** presenza di insetti lignicoli, rodilegno, infezioni di occhio di pavone, cercosporiosi e lebbra.**PROGRAMMA DI DIFESA:** Durante le operazioni di potatura, asportare tutte le parti che presentano esiti di attacchi parassitari. Si raccomanda, inoltre, di assicurare un buon arieggiamento della chioma, in modo tale da consentire alla pianta migliori condizioni vegetative e, al tempo stesso, evitare un eccessivo ombreggiamento che potrebbe favorire lo sviluppo di crittogame e cocciniglie. Negli impianti giovani, si consiglia di posizionare alla base del tronco le fasce di fibra acrilica, per prevenire gli attacchi di oziorrinco. Durante la fioritura non effettuare trattamenti antiparassitari.AGRUMI**FASE FENOLOGICA:** allegagione.**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** presenza di focolai di afidi.**PROGRAMMA DI DIFESA:** negli agrumeti dove si riscontra la presenza dannosa di afidi, si può intervenire, a completa sfioritura, con aficidi specifici al superamento della soglia di intervento: 5% di germogli attaccati su clementino e mandarino e 10% su arancio per l'afide verde; 25% di germogli attaccati per l'afide scuro.