

COMUNICATO FITOSANITARIO

valido dal 29 Maggio al 04 Giugno 2012

**VITE****FASE FENOLOGICA:** allegazione - grani di pepe**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** è stata rilevata la comparsa di infezioni primarie di peronospora, in agro di Nardò e Melissano.**PROGRAMMA DI DIFESA:** intervenire dopo la fioritura con il secondo trattamento cautelativo contro peronospora ed oidio, utilizzando prodotti sistemici e tenendo conto della persistenza dei prodotti utilizzati con il precedente trattamento. Dove si è già verificata l'infezione primaria di peronospora, si consiglia di mantenere costantemente la protezione della vegetazione, impiegando prodotti sistemici. Raccomandiamo il rispetto delle dosi per ettaro indicate in etichetta ed il passaggio con l'irroratrice da tutti i filari.**OLIVO****FASE FENOLOGICA:** caduta petali - allegazione**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** presenza di insetti lignicoli, rodilegno, infezioni di occhio di pavone, cercosporiosi e lebbra.**PROGRAMMA DI DIFESA:** per chi non avesse effettuato il trattamento in pre-fioritura, può effettuarlo nella fase fenologica di allegazione, impiegando prodotti a base di rame rispettando le dosi riportate in etichetta. Si consiglia l'applicazione delle fasce di resinato per la cattura dell'oziorrinco.**AGRUMI****FASE FENOLOGICA:** allegazione - ingrossamento frutti**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** presenza di focolai di afidi.**PROGRAMMA DI DIFESA:** negli agrumeti dove si riscontra la presenza dannosa di afidi, si può intervenire con aficidi specifici al superamento della soglia di intervento: 5% di germogli attaccati su clementino e mandarino e 10% su arancio per l'afide verde; 25% di germogli attaccati per l'afide scuro.