

COMUNICATO FITOSANITARIO

valido dal 05 al 11 Giugno 2012



VITE

FASE FENOLOGICA: grani di pepe-accrescimento acini

SITUAZIONE FITOSANITARIA: è stata rilevata la comparsa di infezioni primarie di peronospora, in agro di Nardò e Melissano.

PROGRAMMA DI DIFESA: per il controllo di peronospora ed oidio si consiglia di intervenire con prodotti endoterapici, tenendo conto della persistenza dei prodotti utilizzati con il precedente trattamento. Dove si è già verificata l'infezione primaria di peronospora, si consiglia di mantenere costantemente la protezione della vegetazione, impiegando prodotti sistemici. Raccomandiamo il rispetto delle dosi per ettaro indicate in etichetta ed il passaggio con l'irroratrice da tutti i filari.

OLIVO

FASE FENOLOGICA: allegazione-ingrossamento frutti

SITUAZIONE FITOSANITARIA: presenza di insetti lignicoli, rodilegno, infezioni di occhio di pavone, cercosporiosi e lebbra.

PROGRAMMA DI DIFESA: per chi non avesse effettuato il trattamento in pre-fioritura, può effettuarlo nella fase fenologica di allegazione, impiegando prodotti a base di rame o i prodotti autorizzati di recente (Flint Max e Insignia) rispettando le dosi riportate in etichetta.

Si consiglia l'applicazione delle fasce di resinato per la cattura dell'oziorrinco.

AGRUMI

FASE FENOLOGICA: ingrossamento frutti

SITUAZIONE FITOSANITARIA: presenza di focolai di afidi.

PROGRAMMA DI DIFESA: negli agrumeti dove si riscontra la presenza dannosa di afidi, si può intervenire con aficidi specifici al superamento della soglia di intervento: 5% di germogli attaccati su clementino e mandarino e 10% su arancio per l'afide verde; 25% di germogli attaccati per l'afide scuro.