

## COMUNICATO FITOSANITARIO

valido dal 03 al 09 Luglio 2012

VITE**FASE FENOLOGICA:** chiusura grappolo.**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** sporadiche infezioni di peronospora; isolati focolai di infezioni oidiche sulle foglie e sul grappolo.**PROGRAMMA DI DIFESA:** per il controllo della peronospora, soprattutto dove si è già verificata l'infezione primaria, si consiglia di mantenere costantemente la protezione della vegetazione impiegando prodotti endoterapici associati al rame, tenendo conto della persistenza dei prodotti utilizzati con il precedente trattamento. Contro l'oidio adoperare prodotti endoterapici, avendo cura, nel caso di infezioni persistenti, di effettuare una solforazione a secco tra due trattamenti liquidi. Raccomandiamo il rispetto delle dosi per ettaro indicate in etichetta ed il passaggio con l'irroratrice da tutti i filari.OLIVO**FASE FENOLOGICA:** ingrossamento frutti - pre indurimento nocciolo**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** presenza di insetti lignicoli, rodilegno, infezioni di occhio di pavone, cercosporiosi e lebbra. E' ancora in corso il volo della tignola dell'olivo.**PROGRAMMA DI DIFESA:** per il controllo delle crittogame, effettuare un trattamento impiegando prodotti a base di rame o pyraclostrobin (Insignia - utilizzabile fino al 31 Luglio 2012) per il controllo della Lebbra, rispettando le dosi riportate in etichetta. Si raccomanda di non effettuare trattamenti indiscriminati contro la tignola dell'olivo, ma di valutare la necessità dell'intervento, con l'aiuto di un tecnico, utilizzando eventualmente prodotti a base di dimetoato o fosmet. Si consiglia l'applicazione delle fasce di resinato per la cattura dell'oziorrinco. Si ricorda, inoltre, che la presenza di fumaggine sulla vegetazione è una conseguenza dell'infestazione della cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*), pertanto la lotta dovrà essere diretta contro la suddetta cocciniglia effettuando un trattamento a base di olio minerale bianco, alla completa schiusura delle uova che avverrà, tra la fine luglio e i primi di agosto.AGRUMI**FASE FENOLOGICA:** ingrossamento frutti - allungamento germogli**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** presenza di focolai di afidi.**PROGRAMMA DI DIFESA:** negli agrumeti dove si riscontra la presenza dannosa di afidi, si può intervenire con aficidi specifici al superamento della soglia di intervento: 5% di germogli attaccati su clementino e mandarino e 10% su arancio per l'afide verde; 25% di germogli attaccati per l'afide scuro.