

COMUNICATO FITOSANITARIO

valido dal 17 al 23 Luglio 2012

VITE**FASE FENOLOGICA:** chiusura grappolo - invaiatura.**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** sporadiche infezioni di peronospora; isolati focolai di infezioni oidiche sulle foglie e sul grappolo.**PROGRAMMA DI DIFESA:** per il controllo della peronospora, soprattutto dove si è già verificata l'infezione primaria, si consiglia di mantenere costantemente la protezione della vegetazione impiegando prodotti endoterapici associati al rame, tenendo conto della persistenza dei prodotti utilizzati con il precedente trattamento. Contro l'oidio adoperare prodotti endoterapici. Raccomandiamo il rispetto delle dosi per ettaro indicate in etichetta ed il passaggio con l'irroratrice da tutti i filari.OLIVO**FASE FENOLOGICA:** ingrossamento frutti**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** presenza di insetti lignicoli, rodilegno, infezioni di occhio di pavone, cercosporiosi e lebbra.**PROGRAMMA DI DIFESA:** per il controllo delle crittogame, effettuare un trattamento impiegando prodotti a base di rame o pyraclostrobin (Insignia - utilizzabile fino al 31 Luglio 2012) per il controllo della Lebbra, rispettando le dosi riportate in etichetta. Si consiglia l'applicazione delle fasce di resinato per la cattura dell'oziorrinco. Si ricorda, inoltre, che la presenza di fumaggine sulla vegetazione è una conseguenza dell'infestazione della cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*), pertanto la lotta dovrà essere diretta contro la suddetta cocciniglia effettuando un trattamento a base di olio minerale bianco, alla completa schiusura delle uova che avverrà, tra la fine luglio e i primi di agosto. Collocare negli oliveti le trappole attrattive per il monitoraggio del volo della mosca (*Bactrocera oleae*).AGRUMI**FASE FENOLOGICA:** allungamento germogli II fase**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** presenza di focolai di afidi e cotonello (*Planococcus citri*); è iniziato il volo della Cocciniglia rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*).**PROGRAMMA DI DIFESA:** negli agrumeti dove si riscontra la presenza dannosa di afidi, si può intervenire con aficidi specifici al superamento della soglia di intervento: 5% di germogli attaccati su clementino e mandarino e 10% su arancio per l'afide verde; 25% di germogli attaccati per l'afide scuro.

Contro il cotonello intervenire al superamento della soglia (5% di frutti colpiti), con prodotti a base di olio minerale bianco da associare ad un estere fosforico registrato sulla coltura.

