

COMUNICATO FITOSANITARIO

valido dal 16 al 22 Ottobre 2012

VITE**FASE FENOLOGICA:** stasi vegetativa.**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** presenza di piante colpite dal mal dell'esca ed escoriosi.**PROGRAMMA DI DIFESA:** nessun trattamento fitosanitario. Si consiglia di contrassegnare le piante affette da mal dell'esca al fine di poterle individuare facilmente al momento della potatura ed intervenire separatamente; per le piante colpite da escoriosi, si suggeriscono alcuni interventi di carattere agronomico:

- raccogliere i tralci infetti e bruciarli fuori dal campo, evitandone l'accantonamento.
- non effettuare la trinciatura degli stessi in campo.

OLIVO**FASE FENOLOGICA:** invaiatura - maturazione**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** presenza di margaronia, insetti lignicoli, rodilegno, infezioni di occhio di pavone, cercosporiosi e lebbra. Sono state riscontrate ovideposizioni di mosca sulle varietà da olio.**PROGRAMMA DI DIFESA:** Contro le crittogame dell'olivo si consiglia l'utilizzo di prodotti a base di rame.

Prestare attenzione ad eventuali attacchi di mosca (*Bactrocera oleae*), intervenendo, dove necessario, al superamento della soglia del 10% di drupe infestate, con prodotti a base di *dimethoato*, *fosmet* o *imidacloprid*. Contro gli adulti è possibile intervenire preventivamente utilizzando Attract & kill (pannelli-trappole a feromoni con piccole dosi di deltametrina), oppure un'esca a base di spinosad (Spintor fly). Per le particolari modalità di distribuzione di questo ultimo prodotto (5 litri di soluzione per ettaro), è preferibile farsi seguire inizialmente da un tecnico o da chi ha già esperienza nell'uso di Spintor fly. Contro la margaronia, si consiglia di intervenire solo negli impianti in allevamento e dopo averne accertata la presenza, impiegando il *Bacillus thuringiensis*. Si consiglia di rispettare scrupolosamente i tempi di carenza dei prodotti impiegati.

AGRUMI**FASE FENOLOGICA:** ingrossamento frutti - invaiatura per le varietà precoci**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** presenza di cocciniglie, minatrice serpentina e mosca della frutta.

PROGRAMMA DI DIFESA: Per il controllo delle cocciniglie, dove presenti in forma dannosa, si consiglia di effettuare un trattamento, impiegando olio bianco estivo, attivato con un estere fosforico registrato sulla coltura (*clorpirifos-metile*, *clorpirifos*, *pyriproxifen*, *fosmet*). Intervenire contro la minatrice serpentina solo sulle piante in allevamento e sugli innesti con prodotti a base di : *flufenoxuron*, *metossifenozone*, *tebufenozide*, *imidacloprid*, *azadiractina*, *abamectina*, *acetamiprid*, *clorantropilprole* in associazione con olio bianco estivo impiegato alla dose dello 0,5%. Per il controllo della mosca della frutta (*Ceratitis capitata*), si consiglia di intervenire quando risulta infestato dall'insetto il 2-3% dei frutti, con prodotti a base di *etofenprox*, *fosmet* e *spinosad*. Si consiglia di rispettare scrupolosamente i tempi di carenza dei prodotti impiegati.

