

COMUNICATO FITOSANITARIO

valido dal 23 al 29 Ottobre 2012

VITE**FASE FENOLOGICA:** stasi vegetativa.**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** presenza di piante colpite da mal dell'esca ed escoriosi.**PROGRAMMA DI DIFESA:** nessun trattamento fitosanitario. Si consiglia di contrassegnare le piante affette da mal dell'esca al fine di poterle individuare facilmente al momento della potatura ed intervenire separatamente; per le piante colpite da escoriosi, si suggeriscono alcuni interventi di carattere agronomico:

- raccogliere i tralci infetti e bruciarli fuori dal campo, evitandone l'accantonamento.
- non effettuare la trinciatura degli stessi in campo.

OLIVO**FASE FENOLOGICA:** invaiatura - maturazione**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** presenza di margaronia, insetti lignicoli, rodilegno, infezioni di occhio di pavone, cercosporiosi e lebbra. Sono state riscontrate ovideposizioni di mosca sulle varietà da olio.**PROGRAMMA DI DIFESA:** Contro le crittogame dell'olivo si consiglia l'utilizzo di prodotti a base di rame.

Prestare attenzione ad eventuali attacchi di mosca (*Bactrocera oleae*), intervenendo, dove necessario, al superamento della soglia del 10% di drupe infestate, con prodotti a base di *dimethoato*, *fosmet* o *imidacloprid*. **Il trattamento chimico è ammesso solo ed esclusivamente se il programma di raccolta, consente di rispettare il tempo di carenza indicato in etichetta.** Contro gli adulti è possibile intervenire preventivamente utilizzando Attract & kill (pannelli-trappole a feromoni con piccole dosi di deltametrina), oppure un'esca a base di spinosad (Spintor fly). Per le particolari modalità di distribuzione di questo ultimo prodotto (5 litri di soluzione per ettaro), è preferibile farsi seguire inizialmente da un tecnico o da chi ha già esperienza nell'uso di Spintor fly. Se al momento dell'applicazione del prodotto è già presente l'infestazione della mosca, si consiglia di far precedere un trattamento larvicida con una delle sostanze attive già menzionate. Contro la margaronia, si consiglia di intervenire solo negli impianti in allevamento e dopo averne accertata la presenza, impiegando il *Bacillus thuringiensis*.

AGRUMI**FASE FENOLOGICA:** ingrossamento frutti - invaiatura per le varietà precoci**SITUAZIONE FITOSANITARIA:** presenza di cocciniglie, minatrice serpentina e mosca della frutta.

PROGRAMMA DI DIFESA: Per il controllo delle cocciniglie, dove presenti in forma dannosa, si consiglia di effettuare un trattamento, impiegando olio bianco estivo, attivato con un estere fosforico registrato sulla coltura (*clorpirifos-metile*, *clorpirifos*, *pyriproxifen*, *fosmet*). Intervenire contro la minatrice serpentina solo sulle piante in allevamento e sugli innesti con prodotti a base di : *flufenoxuron*, *metossifenozone*, *tebufenozone*, *imidacloprid*, *azadiractina*, *abamectina*, *acetamiprid*, *clorantraniliprole* in associazione con olio bianco estivo impiegato alla dose dello 0,5%. Per il controllo della mosca della frutta (*Ceratitis capitata*), si consiglia di intervenire quando risulta infestato dall'insetto il 2-3% dei frutti, con prodotti a base di *etofenprox*, *fosmet* e *spinosad*. Si consiglia di rispettare scrupolosamente i tempi di carenza dei prodotti impiegati.

