Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 05/07/2016 - 11/07/2016

PROVINCIA DI: LECCE

Comprensorio: P.ra di Lecce Nord

CAMPI SALENTINA
COPERTINO
LECCE
NARDO'
NOVOLI
SURBO
TREPUZZI
VEGLIE

Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Indurimento nocciolo

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra di Lecce Nord	60,98	2,38	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Dalle nostre rilevazioni settimanali i voli di tignola dell'olivo sui nostri campi di osservazione risultano nella loro curva discendente, la percentuale di olive attaccate è in diminuzione anche per i trattamenti fitosanitari effettuati.
Pertanto, tenuto conto che per la maggior parte delle varietà ci si trova nella fase di indurimento nocciolo oramai completata, in generale non consigliamo trattamenti. Da valutare eventualmente casi specifici che non rientrano nelle condizioni suddette e, nel caso di infestazione sopra la soglia d'intervento, considerando che abbiamo riscontrato un'elevata presenza di Rinchite (Coenorrhynus cribripennis) detto anche punteruolo delle olive e di Margaronia (Paipita unionalis), procedere con: se in lotta integrata è possibile intervenire con principi attivi per contatto (deltametrina, cipermetrina) o citotropici (dimetoato, fosmet), in lotta biologica sono utilizzabili Bacillus thuringensis, piretrine naturali o azadiractina.

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 11/07/2016

Tendenza della nuvolosità fino al 16/07/2016

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

11/7/2016

Max 34

Min 23



Sereno

12/7/2016

Max 36

Min 23



Sereno

13/7/2016

Max 37

Min 24



Sereno

14/7/2016

Min 23

Max 36



Sereno

15/7/2016

Min 21

Max 28



Sereno

16/7/2016

Min 21

Max 27

Possibilita' di pioggia

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 05/07/2016 - 11/07/2016

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: P.ra Salentina Centr

ACQUARICA DEL CAPO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
GALATINA
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LECCE
LIZZANELLO
MARTANO
MARTIGNANO
MELENDUGNO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SANTA CESAREA TERME
SPONGANO
UGENTO
VERNOLE

Il Tecnico:
ALBERTO DANESE - Cellulare: 3395751599

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Indurimento nocciolo

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra Salentina Centr	37,51	4,47	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Dalle nostre rilevazioni settimanali i voli di tignola dell'olivo sui nostri campi di osservazione risultano nella loro curva discendente, la percentuale di olive attaccate è in diminuzione anche per i trattamenti fitosanitari effettuati.
Pertanto, tenuto conto che per la maggior parte delle varietà ci si trova nella fase di indurimento nocciolo oramai completata, in generale non consigliamo trattamenti. Da valutare eventualmente casi specifici che non rientrano nelle condizioni suddette e, nel caso di infestazione sopra la soglia d'intervento, considerando che abbiamo riscontrato un'elevata presenza di Rinchite (Coenorrhynus cribripennis) detto anche punteruolo delle olive e di Margaronia (Paipita unionalis), procedere con: se in lotta integrata è possibile intervenire con principi attivi per contatto (deltametrina, cipermetrina) o citotropici (dimetoato, fosmet), in lotta biologica sono utilizzabili Bacillus thuringensis, piretrine naturali o azadiractina.

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 11/07/2016

Tendenza della nuvolosita' fino al 16/07/2016

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

11/7/2016

Max 34

Min 23



Sereno

12/7/2016

Max 36

Min 23



Sereno

13/7/2016

Max 37

Min 24



Sereno

14/7/2016

Min 23

Max 36



Sereno

15/7/2016

Min 21

Max 28



Sereno

16/7/2016

Min 21

Max 27

Possibilita' di pioggia

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc.Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 05/07/2016 - 11/07/2016

PROVINCIA DI: BRINDISI



Comprensorio: Collina Litoranea Br

CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
VILLA CASTELLI

Il Tecnico:
RAFFAELE DEGIOVANNI - Cellulare: 3388912796

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Indurimento nocciolo

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Collina Litoranea Br	57,72	2,76	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Dalle nostre rilevazioni settimanali i voli di tignola dell'olivo sui nostri campi di osservazione risultano nella loro curva discendente, la percentuale di olive attaccate è in diminuzione anche per i trattamenti fitosanitari effettuati.

Pertanto, tenuto conto che per la maggior parte delle varietà ci si trova nella fase di indurimento nocciolo oramai completata, in generale non consigliamo trattamenti. Da valutare eventualmente casi specifici che non rientrano nelle condizioni suddette e, nel caso di infestazione sopra la soglia d'intervento, considerando che abbiamo riscontrato un'elevata presenza di Rinchite (Coenorrhynus cribripennis) detto anche punteruolo delle olive e di Margaronia (Paipita unionalis), procedere con: se in lotta integrata è possibile intervenire con principi attivi per contatto (deltametrina, cipermetrina) o citotropici (dimetoato, fosmet), in lotta biologica sono utilizzabili Bacillus thuringensis, piretrine naturali o azadiractina.

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 11/07/2016

Tendenza della nuvolosita' fino al 16/07/2016

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

11/7/2016

Max 34

Min 23

Sereno

12/7/2016

Max 36

Min 24

Sereno

13/7/2016

Max 37

Min 24

Sereno

14/7/2016

Min 21

Max 36

Sereno

15/7/2016

Min 19

Max 28

Sereno

16/7/2016

Min 19

Max 28

Sereno

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 05/07/2016 - 11/07/2016

PROVINCIA DI: TARANTO



Comprensorio: Pianura di Taranto

CASTELLANETA
CRISPIANO
GINOSA
MASSAFRA
MOTTOLA
PALAGIANELLO

Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Indurimento nocciolo

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura di Taranto	34	1,6	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Dalle nostre rilevazioni settimanali i voli di tignola dell'olivo sui nostri campi di osservazione risultano nella loro curva discendente, la percentuale di olive attaccate è in diminuzione anche per i trattamenti fitosanitari effettuati.
Pertanto, tenuto conto che per la maggior parte delle varietà ci si trova nella fase di indurimento nocciolo oramai completata, in generale non consigliamo trattamenti. Da valutare eventualmente casi specifici che non rientrano nelle condizioni suddette e, nel caso di infestazione sopra la soglia d'intervento, considerando che abbiamo riscontrato un'elevata presenza di Rinchite (Coenorrhynus cribripennis) detto anche punteruolo delle olive e di Margaronia (Paipita unionalis), procedere con: se in lotta integrata è possibile intervenire con principi attivi per contatto (deltametrina, cipermetrina) o citotropici (dimetoato, fosmet), in lotta biologica sono utilizzabili Bacillus thuringensis, piretrine naturali o azadiractina.

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 11/07/2016

Tendenza della nuvolosità fino al 16/07/2016

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

11/7/2016

Max 34

Min 23

Sereno

12/7/2016

Max 36

Min 24

Sereno

13/7/2016

Max 37

Min 24

Sereno

14/7/2016

Min 21

Max 36

Sereno

15/7/2016

Min 19

Max 28

Sereno

16/7/2016

Min 19

Max 28

Sereno