Italia Olivicola
CONSORZIO NAZIONALE

APOL

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 10 MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA': 16/09/2024 - 22/09/2024



COMPRENSORIO - LE - PIANURA SALENTINA NORD

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
CAVALLINO
COPERTINO
LECCE
LIZZANELLO
MONTERONI DI LECCE
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TREPUZZI
VEGLIE
VERNOLE

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	18	3	5%	PEGGIORAMENTO	ALTO

PREVISIONI METEO

16/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	21/09/2024	22/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

I risultati del nostro monitoraggio di questa settimana, rilevano un aumento dell'infestazione della mosca dell'olivo (bractocera oleae) su tutte le varietà di olive con riferimento sia al numero di catture di adulti sia alle percentuali di infestazione.

Tuttavia, mentre per le varietà a drupa piccola, ad eccezione di situazioni particolari di oliveti ubicati in zone costiere e/o irrigue, in molti casi non si è raggiunta la soglia di intervento, sulle varietà a drupa grossa la percentuale di infestazione ha quasi sempre superato il limite. Ricordiamo che la soglia d'intervento, per le olive da mensa, corrisponde alla comparsa delle prime punture, per le olive da olio risulta pari al 4-5% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve).

Pertanto anche questa settimana, per chi non avesse già eseguito un trattamento fitosanitario in precedenza, si consiglia d'intervenire, soprattutto negli oliveti irrigui e/o ubicati lungo la fascia costiera.

Si interviene con prodotti a base di acetamiprid, upyradifurone; in alternativa è possibile intervenire, preventivamente con trattamenti adulticidi, impiegando esche proteiche attivate con un insetticida autorizzato. All'aumento delle catture sulle trappole si possono utilizzare, in maniera preventiva, caolino o zeolite per creare una barriera protettiva come deterrente per l'ovideposizione.

Si allega il Disciplinare di Difesa Integrata 2024 dell'Olivo per la Regione Puglia

Italia Olivicola
CONSORZIO NAZIONALE

APOL

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 10 MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA': 16/09/2024 - 22/09/2024



COMPRENSORIO - LE - PIANURA SALENTINA SUD

ACQUARICA DEL CAPO
ALEZIO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
GALLIPOLI
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
MARTANO
MATINO
MELENDUGNO
MELISSANO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SALVE
SAN CASSIANO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	16	3	5%	PEGGIORAMENTO	ALTO

PREVISIONI METEO

16/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	21/09/2024	22/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

I risultati del nostro monitoraggio di questa settimana, rilevano un aumento dell'infestazione della mosca dell'olivo (bractocera oleae) su tutte le varietà di olive con riferimento sia al numero di catture di adulti sia alle percentuali di infestazione.
Tuttavia, mentre per le varietà a drupa piccola, ad eccezione di situazioni particolari di oliveti ubicati in zone costiere e/o irrigue, in molti casi non si è raggiunta la soglia di intervento, sulle varietà a drupa grossa la percentuale di infestazione ha quasi sempre superato il limite. Ricordiamo che la soglia d'intervento, per le olive da mensa, corrisponde alla comparsa delle prime punture, per le olive da olio risulta pari al 4-5% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve).
Pertanto anche questa settimana, per chi non avesse già eseguito un trattamento fitosanitario in precedenza, si consiglia d'intervenire, soprattutto negli oliveti irrigui e/o ubicati lungo la fascia costiera.
Si interviene con prodotti a base di acetamiprid, upyradifurone; in alternativa è possibile intervenire, preventivamente con trattamenti adulticidi, impiegando esche proteiche attivate con un insetticida autorizzato. All'aumento delle catture sulle trappole si possono utilizzare, in maniera preventiva, caolino o zeolite per creare una barriera protettiva come deterrente per l'ovideposizione.
Si allega il Disciplinare di Difesa Integrata 2024 dell'Olivo per la Regione Puglia

Italia Olivicola
CONSORZIO NAZIONALE

APOL

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 10 MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA': 16/09/2024 - 22/09/2024



COMPRENSORIO - BR - COLLINA LITORANEA

BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
CELLINO SAN MARCO
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
ORIA
OSTUNI
SAN DONACI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
TORRE SANTA SUSANNA
VILLA CASTELLI
SAN GIORGIO IONICO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	21	4	5%	PEGGIORAMENTO	ALTO

PREVISIONI METEO

16/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	21/09/2024	22/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

I risultati del nostro monitoraggio di questa settimana, rilevano un aumento dell'infestazione della mosca dell'olivo (bractocera oleae) su tutte le varietà di olive con riferimento sia al numero di catture di adulti sia alle percentuali di infestazione.
Tuttavia, mentre per le varietà a drupa piccola, ad eccezione di situazioni particolari di oliveti ubicati in zone costiere e/o irrigue, in molti casi non si è raggiunta la soglia di intervento, sulle varietà a drupa grossa la percentuale di infestazione ha quasi sempre superato il limite. Ricordiamo che la soglia d'intervento, per le olive da mensa, corrisponde alla comparsa delle prime punture, per le olive da olio risulta pari al 4-5% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve).
Pertanto anche questa settimana, per chi non avesse già eseguito un trattamento fitosanitario in precedenza, si consiglia d'intervenire, soprattutto negli oliveti irrigui e/o ubicati lungo la fascia costiera.
Si interviene con prodotti a base di acetamiprid, upyradifurone; in alternativa è possibile intervenire, preventivamente con trattamenti adulticidi, impiegando esche proteiche attivate con un insetticida autorizzato. All'aumento delle catture sulle trappole si possono utilizzare, in maniera preventiva, caolino o zeolite per creare una barriera protettiva come deterrente per l'ovideposizione.
Si allega il Disciplinare di Difesa Integrata 2024 dell'Olivo per la Regione Puglia

METODI DI LOTTA

Di seguito si elencano i metodi di lotta preventivi e curativi indicati nel Disciplinare di Difesa Integrata Olivo 2024

Mosca delle olive (Bactrocera oleae)	**SOGLIA DI INTERVENTO** **• Per le olive da tavola: quando si nota la presenzadelle prime punture.** **• Per le olive da olio: in funzione delle varietà 4-5% diinfestazione attiva (sommatoria di uova e larve)** **INTERVENTI CHIMICI** Nelle olive da mensa anche la sola puntura può determinare deformazione della drupa, pertanto l'intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture. Nelle olive da olio effettuare interventi: - **preventivi (**adulticidi) esclusivamente utilizzando esche proteiche attivate con formulati specifici autorizzati a base di deltametrina, spinosad o acetamiprid eventualmente innescati con feromone, o istallando trappole per la cattura massale - **curativi (**nei confronti delle larve) al raggiungimento della soglia, intervenire nei confronti nelle prime fasi di sviluppo della mosca (uovo e larva di 1° età) CAOLINO-ZEOLITE- repellente	*Opius concolor* *Beauveria bassiana* Cattura massale Sistemi tipo attact end kill Acetamiprid Carenza 21 gg Flupyradifurone Carenza 14 gg "Exirel Bait" a base della s.a. cyantraniliprole Carenza 7 gg	**lanci da programmare con i centri diassistenza tecnica** **solo formulato con specifica esca prontaall'uso** **Numero massimo 2 intervento l'anno* (Non ammesso in agricoltura biologica)** **Numero massimo 1 intervento l'anno* (Non ammesso in agricoltura biologica)** **Numero massimo 3 interventi l'anno* (Non ammesso in agricoltura biologica)** *** A prescindere dall'avversità**