



Obiettivo: c) Miglioramento la competitività a medio e lungo termine

Intervento: b) Servizi di consulenza e assistenza tecnica Intervento

P.O. olio anno 2025

Bollettino Settimanale di Informazione FitoPatologica

Bollettino Fitopatologico n. 2

> ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI/CAMPI SPIA <

COMPENSORIO N° 1 - BR - COLLINA LITORANEA	BRINDISI - CAROVIGNO-CEGLIE MESSAPICA-CELLINO SAN MARCO-FASANO-FRANCAVILLA FONTANA-MESAGNE-ORIA-OSTUNI-SAN DONACI-SAN VITO DEI
COMPENSORIO N° 2 - LE - PIANURA SALENTINA NORD	NORMANNI-TORCHIAROLO-TORRE SANTA SUSANNA-VILLA CASTELLI
COMPENSORIO N° 3 LE - PIANURA SALENTINA SUD	ARNESANO-CAMPI SALENTINA-CAVALLINO-COPERTINO-LECCE-LIZZANELLO-NARDO-MONTERONI DI LECCE-NOVOLI-SALICE SALENTINO-SURBO-TREPUZZI-VEGLIE-VERNOLE
	ACQUARICA DEL CAPO-ALEZIO-CANNOLE-CARPIGNANO SALENTINO-CASARANO-GALLIPOLI-GIUGGIANELLO-GIURDIGNANO-MARTANO-MATINO-MELENDUGNO-MELISSANO-MINERVINO DI LECCE-NOCIGLIA-OTRANTO-PALMARIGGI-POGGIARDO-PRESICCE-RUFFANO-SALVE-SAN CASSIANO-UGENTO

> SITUAZIONE METEOROLOGICA

Fino a Giovedì 24 Luglio lo scenario vedrà un dominio anticiclonico quasi incontrastato su gran parte del Centro e soprattutto al Sud, dove il termometro farà segnare valori bollenti, prossimi ai 40°C su Calabria, Puglia e addirittura oltre i 44/45°C nell'entroterra siciliano. A far compagnia ai climatizzatori, un cielo sereno o al massimo velato, in un'atmosfera che saprà ancora di Estate africana. (Fonte "ilmeteo.it")

Parassita: Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)

Stadio fenologico: Indurimento Nocciolo - Accrescimento Drupe

RILIEVI DI CAMPO		21/07/2025 - 27/07/2025		
Insetti catturati su trappola comprensorio		Infestazione %	Soglia d'intervento %	
	Media		Olive da Olio	Olive da Mensa
COMPENSORIO N° 1 - BR - COLLINA LITORANEA	4	0	4_5	Prime Punture
COMPENSORIO N° 2 - LE - PIANURA SALENTINA NORD	2	0	4_5	Prime Punture
COMPENSORIO N° 3 LE - PIANURA SALENTINA SUD	1	0	4_5	Prime Punture

> SITUAZIONE FITOSANITARIA DEL TERRITORIO

Registrate nelle trappole catture di mosca (*Bactrocera oleae*).

Presenza di occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*), cercosporiosi (*Pseudocercospora cladosporioides*) e margaronia (*Palpita unionalis*).

> CONSIGLI FITOPATOLOGICI (Compensorio n° 1 - 2 - 3)

La settimana oggetto della nostra rilevazione è stata caratterizzata da un ulteriore innalzamento delle temperature che naturalmente sfavorisce l'ovideposizione. Dal controllo sul grado d'infestazione della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) si è riscontrato un basso numero di catture.

Il campionamento delle drupe con osservazione al microscopio non ha rilevato presenza di uova e larve di prima età.

Alla luce di quanto rilevato, negli areali di riferimento **non si ritiene giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario**.

Si allega il Disciplinare di Difesa Integrata 2025 dell'Olio per la Regione Puglia

Sono state installate le trappole per il monitoraggio della mosca olearia in tutti i comprensori.

N. B. Si consiglia il monitoraggio delle drupe per verificare il grado d'infestazione delle olive.

Prelevare a caso 100 drupe verificare la presenza di punture fertili soglia d'intervento 10% per le olive da olio 2% per le olive da tavola.

Per informazioni contattare: 0832-2314287

Lecce (LE)

28/07/2025

Difesa integrata Olivo Puglia 2025

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. e AUSILIARI	(MoA)	(1)	(2)	(3)	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Mosca delle olive (<i>Bactrocera oleae</i>)	Soglia di intervento - per le olive da tavola: quando si nota la presenza delle prime punture, intervenire al raggiungimento della soglia del 4-5 % di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve di prima età) ; - è fortemente raccomandato l'impiego di trappole per il monitoraggio delle popolazioni di adulti. Interventi chimici: - nelle olive da mensa anche la sola puntura può determinare deformazione della drupa, pertanto l'intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture. Nelle olive da olio effettuare interventi: - preventivi (adulterici), esclusivamente utilizzando esche proteiche attivate con formulati specifici autorizzati a base di: deltametrina, spinosad, cyantraniliprole, acetamiprid o lambda-cialotrina, eventualmente innescati con feromone, o installando trappole per la cattura massale - curativi (nei confronti delle larve), al raggiungimento della soglia, intervenire nei confronti delle prime fasi di sviluppo della mosca (uova e larva di prima età)	Azadiractina	UN			SI	
		Opius concolor					
		Beauveria bassiana	UNF			SI	
		Cattura massale				SI	
		Attrackt and kill con: Deltametrina				SI	Per interventi preventivi adulterici, secondo quanto riportato nei criteri d'intervento
		Attrackt and kill con: Lambda-cialotrina				SI	
		Esche proteiche attivate con: Acetamiprid				SI	
		Esche proteiche attivate con: Cyantraniliprole				SI	
		Esche proteiche attivate con: Spinosad				SI	
		Acetamiprid	4A		2		Per interventi curativi, secondo quanto riportato nei criteri d'intervento. Per le olive da tavola il limite è 1.
		Flupyradifurone	4D		1		

(MoA) Codice meccanismo d'azione

(1) N. max interventi per singola s.a. indipendentemente dall'avversità

(2) N. max interventi per gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(3) Sostanze non soggette alle limitazioni per avversità