



Obiettivo: c) Miglioramento la competitività a medio e lungo termine

Intervento: b) Servizi di consulenza e assistenza tecnica Intervento

P.O. olio anno 2025

Bollettino Settimanale di Informazione FitoPatologica

Bollettino Fitopatologico n. 4

> ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI/CAMPI SPIA <

COMPENSORIO N° 1 - BR - COLLINA LITORANEA	BRINDISI - CAROVIGNO-CEGLIE MESSAPICA-CELLINO SAN MARCO-FASANO-FRANCAVILLA FONTANA-MESAGNE-ORIA-OSTUNI-SAN DONACI-SAN VITO DEI CASTELLI
COMPENSORIO N° 2 - LE - PIANURA SALENTINA NORD	ARNESANO-CAMPI SALENTINA-CAVALLINO-COPERTINO-LECCE-LIZZANELLO-NARDO-MONTERONI DI LECCE-NOVOLI-SALICE SALENTINO-SURBO-TREPUZZI-VEGLIE-VERNOLE
COMPENSORIO N° 3 LE - PIANURA SALENTINA SUD	ACQUARICA DEL CAPO-ALEZIO-CANNOLE-CARPIGNANO SALENTINO-CASARANO-GALLIPOLI-GIUGGIANELLO-GIURDIGNANO-MARTANO-MATINO-MELENDUGNO-MELISSANO-MINERVINO DI LECCE-NOCIGLIA-OTRANTO-PALMARIGGI-POGGIARDO-PRESICCE-RUFFANO-SALVE-SAN CASSIANO-UGENTO

> SITUAZIONE METEOROLOGICA

Sulle regioni di Puglia e Basilicata sono attese condizioni meteo stabili ed ampiamente soleggiate, con rialzo delle temperature per il dominio dell'anticiclone africano che ci accompagnerà sino al Ferragosto e oltre. Temperature in lieve ulteriore lieve aumento, con picchi fino a +35/36°C tra Brindisi e Lecce. (Fonte "ilmeteo.it")

Parassita: Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*)

Stadio fenologico: Indurimento Nocciolo

RILIEVI DI CAMPO		04/08/2025 - 10/08/2025		
Insetti catturati su trappola comprensorio		Infestazione %	Soglia d'intervento %	
	Media		Olive da Olio	Olive da Mensa
COMPENSORIO N° 1 - BR - COLLINA LITORANEA	8	0	4_5	Prime Punture
COMPENSORIO N° 2 - LE - PIANURA SALENTINA NORD	6	0	4_5	Prime Punture
COMPENSORIO N° 3 LE - PIANURA SALENTINA SUD	4	0	4_5	Prime Punture

> SITUAZIONE FITOSANITARIA DEL TERRITORIO

Registrate nelle trappole catture di mosca (*Bactrocera oleae*).

Presenza di occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*), cercosporiosi (*Pseudocercospora cladosporioides*) e margaronia (*Palpita unionalis*).

> CONSIGLI FITOPATOLOGICI (Comprensorio n° 1 - 2 - 3)

Sulla base dei dati osservati dal monitoraggio settimanale sul grado d'infestazione della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) questa settimana conteggiamo un leggero aumento del numero di catture nelle trappole a feromoni installate nei differenti campi di monitoraggio in particolar modo nelle zone costiere e su varietà a drupa grossa. I valori termici massimi e minimi si sono mantenuti ancora pressoché stabili, e le previsioni per i prossimi giorni segnalano un aumento delle temperature.

Anche dai dati rilevati dal campionamento delle olive abbiamo verificato una pressione fitosanitaria modesta e come uniche eccezioni punte del 2% osservate in zone costiere di tutti comprensori e su varietà a drupa grossa.

Alla luce di quanto rilevato, negli areali di riferimento **non si ritiene giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario.**

Per chi ha scelto di utilizzare strategie antideponenti e repellenti con polveri di roccia, come il caolino e la bentonite, è ora necessario distribuirle. Si ricorda di aggiungere alle soluzioni di questi prodotti dei bagnanti e degli adesivanti, di bagnare uniformemente le chiome degli olivi per coprire tutte le parti verdi, comprese quelle interne, infine, va controllata la taratura delle macchine distributrici, in modo che le gocce siano uniformemente distribuite sulla vegetazione, evitando gocciolamenti a terra.

Si allega il Disciplinare di Difesa Integrata 2025 dell'Olivo per la Regione Puglia

Sono state installate le trappole per il monitoraggio della mosca olearia in tutti i comprensori.

N. B. Si consiglia il monitoraggio delle drupe per verificare il grado d'infestazione delle olive.

Prelevare a caso 100 drupe verificare la presenza di punture fertili soglia d'intervento 5% per le olive da olio, alle prime punture per le olive da tavola.

Per informazioni contattare: 0832-2314287

Lecce (LE)

11/08/2025

Difesa integrata Olivo Puglia 2025

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. e AUSILIARI	(MoA)	(1)	(2)	(3)	NOTE E LIMITAZIONI D'USO		
Mosca delle olive (<i>Bactrocera oleae</i>)	<p>Soglia di intervento</p> <p>- per le olive da tavola: quando si nota la presenza delle prime punture, intervenire al raggiungimento della soglia del 4-5 % di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve di prima età) ;</p> <p>- è fortemente raccomandato l'impiego di trappole per il monitoraggio delle popolazioni di adulti.</p> <p>Interventi chimici:</p> <p>- nelle olive da mensa anche la sola puntura può determinare deformazione della drupa, pertanto l'intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture.</p> <p>Nelle olive da olio effettuare interventi:</p> <p>- preventivi (adulticidi), esclusivamente utilizzando esche proteiche attivate con formulati specifici autorizzati a base di: deltametrina, spinosad, cyantraniliprole, acetamiprid o lambda-cialotrina, eventualmente innescati con feromone, o installando trappole per la cattura massale</p> <p>- curativi (nei confronti delle larve), al raggiungimento della soglia, intervenire nei confronti delle prime fasi di sviluppo della mosca (uova e larva di prima età)</p>	<i>Azadiractina</i>	UN			SI			
		<i>Opius concolor</i>							
		<i>Beauveria bassiana</i>	UNF				SI		
		<i>Cattura massale</i>					SI		
		<i>Attrackt and kill con: Deltametrina</i>					SI	Per interventi preventivi adulticidi, secondo quanto riportato nei criteri d'intervento	
		<i>Attrackt and kill con: Lambda-cialotrina</i>					SI		
		<i>Esche proteiche attivate con: Acetamiprid</i>					SI		
		<i>Esche proteiche attivate con: Cyantraniliprole</i>					SI		
								SI	Per interventi curativi, secondo quanto riportato nei criteri d'intervento. Per le olive da tavola il limite è 1.
		Acetamiprid	4A		2				
Flupyradifurone	4D		1						

(MoA) Codice meccanismo d'azione

(1) N. max interventi per singola s.a. indipendentemente dall'avversità

(2) N. max interventi per gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(3) Sostanze non soggette alle limitazioni per avversità