


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 5

PERIODO DI VALIDITA':

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

16/08/2022 - 21/08/2022



COMPENSORIO - LE - PIANURA SALENTINA NORD

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
CAVALLINO
COPERTINO
LECCE
LIZZANELLO
MONTERONI DI LECCE
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TREPuzzi
VEGLIE
VERNOLE

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	18	2	5%	PEGGIORAMENTO	MEDIO

PREVISIONI METEO

						
16/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	19/08/2022	20/08/2022	21/08/2022	22/08/2022

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


Sulla base dei dati osservati dal monitoraggio settimanale sul grado d'infestazione della mosca dell'olivo (*bractocera oleae*) rileviamo un aumento degli individui riscontrati sulle trappole a feromoni installate, invece dalla elaborazione dei dati scaturiti dal campionamento diretto delle drupe si osserva ancora una pressione fitosanitaria modesta. Si raccomanda di prestare attenzione negli oliveti irrigui e/o ubicati lungo la fascia costiera, ricordando che la soglia d'intervento, per le olive da mensa, corrisponde alla comparsa delle prime punture, per le olive da olio risulta pari al 5-7% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve), pertanto l'intervento dovrà essere tempestivo. Alla luce di quanto rilevato, non si ritiene giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 5

PERIODO DI VALIDITA':

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

16/08/2022 - 21/08/2022



COMPRENSORIO - LE - PIANURA SALENTINA SUD

ACQUARICA DEL CAPO	MELENDUGNO
ALEZIO	MELISSANO
CANNOLE	MINERVINO DI LECCE
CARPIGNANO SALENTINO	NOCIGLIA
CASARANO	OTRANTO
GALLIPOLI	PALMARIGGI
GIUGGIANELLO	POGGIARDO
GIURDIGNANO	PRESICCE
MARTANO	RUFFANO
MATINO	SALVE
	SAN CASSIANO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	14	2	5%	PEGGIORAMENTO	MEDIO

PREVISIONI METEO

						
16/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	19/08/2022	20/08/2022	21/08/2022	22/08/2022

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


Sulla base dei dati osservati dal monitoraggio settimanale sul grado d'infestazione della mosca dell'olivo (*bractocera oleae*) rileviamo un aumento degli individui riscontrati sulle trappole a feromoni installate, invece dalla elaborazione dei dati scaturiti dal campionamento diretto delle drupe si osserva ancora una pressione fitosanitaria modesta. Si raccomanda di prestare attenzione negli oliveti irrigui e/o ubicati lungo la fascia costiera, ricordando che la soglia d'intervento, per le olive da mensa, corrisponde alla comparsa delle prime punture, per le olive da olio risulta pari al 5-7% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve), pertanto l'intervento dovrà essere tempestivo. Alla luce di quanto rilevato, non si ritiene giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 5

PERIODO DI VALIDITA':

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

16/08/2022 - 21/08/2022



COMPENSORIO - BR - COLLINA LITORANEA

BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
CELLINO SAN MARCO
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
ORIA
OSTUNI
SAN DONACI

SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
TORRE SANTA SUSANNA
VILLA CASTELLI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	16	2	5%	PEGGIORAMENTO	MEDIO

PREVISIONI METEO

						
16/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	19/08/2022	20/08/2022	21/08/2022	22/08/2022

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Sulla base dei dati osservati dal monitoraggio settimanale sul grado d'infestazione della mosca dell'olivo (*bractocera oleae*) rileviamo un aumento degli individui riscontrati sulle trappole a feromoni installate. Le catture sono abbastanza disomogenee in base alle zone osservate. Su varietà da mensa e in irriguo sono osservabili le prime punture fertili del dittero, pertanto, su varietà a destinazione da mensa, si consiglia di intervenire tempestivamente con prodotti insetticidi registrati, o con esche proteiche adulticide, in combinazione con prodotti ad azione sica (caolino, zeolite, talco da silicato di Mg).


Dalla elaborazione dei dati scaturiti dal campionamento diretto delle drupe per le varietà da olio si osserva ancora una pressione fitosanitaria modesta, pertanto alla luce di quanto rilevato, non si ritiene giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 5

PERIODO DI VALIDITA':

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

16/08/2022 - 21/08/2022



COMPENSORIO - TA - PIANURA DI TARANTO

CASTELLANETA
CRISPIANO
FAGGIANO
GINOSA
GROTTAGLIE
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MARUGGIO
MASSAFRA
MONTEIASI

MONTEMESOLA
MOTTOLA
PALAGIANELLO
STATTE
TARANTO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	9	2	5%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
16/08/2022	17/08/2022	18/08/2022	19/08/2022	20/08/2022	21/08/2022	22/08/2022

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Sulla base dei dati osservati dal monitoraggio settimanale sul grado d'infestazione della mosca dell'olivo (*bractocera oleae*) rileviamo un aumento degli individui riscontrati sulle trappole a feromoni installate, invece dalla elaborazione dei dati scaturiti dal campionamento diretto delle drupe si osserva ancora una pressione fitosanitaria modesta. Si raccomanda di prestare attenzione negli oliveti irrigui e/o ubicati lungo la fascia costiera, ricordando che la soglia d'intervento, per le olive da mensa, corrisponde alla comparsa delle prime punture, per le olive da olio risulta pari al 5-7% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve), pertanto l'intervento dovrà essere tempestivo. Alla luce di quanto rilevato, non si ritiene giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario.

Difesa integrata di: Olivo Puglia 2022

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI Tignola dell'olivo (<i>Prays oleae</i>)	<u>Soglia di intervento (solo per la generazione carpofaga)</u> - Per le olive da olio: 10 - 15% di uova e/o di larvette in fase di penetrazione nelle olivine. - Per le olive da tavola: 5 - 7 % <u>Interventi chimici: solo per la generazione carpofaga e per varietà a drupa grossa</u> Intervenire quasi alla fine della curva di volo della generazione antofaga determinata con le trappole a feromone e comunque prima dell'indurimento del nocciolo al superamento della soglia di intervento	Fosmet		2	*Fosmet impiegabile fino al 1/11/2022
		<i>Bacillus thuringiensis</i>			
		Acetamiprid		2	
		Spinetoram	1	2	
Mosca delle olive (<i>Bactrocera oleae</i>)	<u>Soglia di intervento</u> Per le olive da tavola: quando si nota la presenza delle prime punture Per le olive da olio: in funzione delle varietà 5-7% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve) <u>Interventi chimici</u> Nelle olive da mensa anche la sola puntura può determinare deformazione della drupa, pertanto l'intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture. Nelle olive da olio effettuare interventi: - <u>preventivi (adulticidi): esclusivamente</u> utilizzando esche proteiche attivate con formulati specifici autorizzati a base di deltametrina, spinosad o acetamiprid, eventualmente innescati con feromone, o installando trappole per la cattura massale - <u>curativi (nei confronti delle larve):</u> al raggiungimento della soglia, intervenire nei confronti delle prime fasi di sviluppo della mosca (uovo e larva di prima età).	<i>Opius concolor</i>	(*)		(*) lanci da programmare con i centri di assistenza tecnica
		<i>Beauveria bassiana</i>			
		Cattura massale			
		Sistemi tipo attract and kill		(*)	(*) per interventi preventivi adulticidi, secondo quanto riportato nei criteri d'intervento
		Fosmet		2*	(*) Per interventi curativi, secondo quanto riportato nei criteri d'intervento
		Acetamiprid		2*	(*) Per interventi curativi, secondo quanto riportato nei criteri d'intervento
Oziorrinco (<i>Otiorrhynchus cribricollis</i>)	<u>Interventi agronomici</u> Su piante adulte lasciare alla base del tronco i polloni e sul tronco e sulle branche i succhioni, sui quali si soffermano gli adulti. Collocare intorno al tronco delle fasce di resinato o manicotti di plastica per impedire la salita degli adulti nel periodo di massima attività dell'insetto (maggio - giugno e settembre - ottobre).				

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità

(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità