


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 8

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

02/09/2024 - 08/09/2024



COMPENSORIO - LE - PIANURA SALENTINA NORD

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
CAVALLINO
COPERTINO
LECCE
LIZZANELLO
MONTERONI DI LECCE

NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TREPZZI
VEGLIE
VERNOLE

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	15	3	5%	PEGGIORAMENTO	MEDIO

PREVISIONI METEO

						
02/09/2024	03/09/2024	04/09/2024	05/09/2024	06/09/2024	07/09/2024	08/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Sulla base dei dati osservati dal monitoraggio settimanale sul grado d'infestazione della mosca dell'olivo (*bractocera oleae*), rileviamo un leggero aumento delle catture di adulti di mosca nelle trappole attrattive e dalla elaborazione dei dati scaturiti dal campionamento diretto delle drupe, notiamo che le percentuali di infestazione sono leggermente cresciute rispetto alla settimana precedente e nelle zone costiere e in campi irrigui in pochi casi hanno raggiunto la soglia d'intervento.

Si ritiene pertanto giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario, principalmente negli oliveti irrigui e/o ubicati lungo la fascia costiera.

Si consiglia di intervenire con prodotti a base di acetamiprid, upyradifurone; in alternativa è possibile intervenire, preventivamente con trattamenti adulticidi, impiegando esche proteiche attivate con un insetticida autorizzato. All'aumento delle catture sulle trappole si possono utilizzare, in maniera preventiva, caolino o zeolite per creare una barriera protettiva come deterrente per l'ovideposizione. Ricordiamo che la soglia d'intervento, per le olive da mensa, corrisponde alla comparsa delle prime punture, per le olive da olio risulta pari al 4-5% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve).


Si allega il Disciplinare di Difesa Integrata 2024 dell'Olivo per la Regione Puglia

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 8

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

02/09/2024 - 08/09/2024



COMPENSORIO - LE - PIANURA SALENTINA SUD

ACQUARICA DEL CAPO
ALEZIO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
GALLIPOLI
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
MARTANO
MATINO
MELENDUGNO
MELISSANO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SALVE
SAN CASSIANO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	12	2	5%	STAZIONARIO	MEDIO

PREVISIONI METEO

						
02/09/2024	03/09/2024	04/09/2024	05/09/2024	06/09/2024	07/09/2024	08/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Sulla base dei dati osservati dal monitoraggio settimanale sul grado d'infestazione della mosca dell'olivo (*bractocera oleae*), rileviamo un leggero aumento delle catture di adulti di mosca nelle trappole attrattive e dalla elaborazione dei dati scaturiti dal campionamento diretto delle drupe, notiamo che le percentuali di infestazione sono leggermente cresciute rispetto alla settimana precedente e nelle zone costiere e in campi irrigui in pochi casi hanno raggiunto la soglia d'intervento.

Si ritiene pertanto giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario, principalmente negli oliveti irrigui e/o ubicati lungo la fascia costiera.


Si consiglia di intervenire con prodotti a base di acetamiprid, upyradifurone; in alternativa è possibile intervenire, preventivamente con trattamenti adulticidi, impiegando esche proteiche attivate con un insetticida autorizzato. All'aumento delle catture sulle trappole si possono utilizzare, in maniera preventiva, caolino o zeolite per creare una barriera protettiva come deterrente per l'ovideposizione. Ricordiamo che la soglia d'intervento, per le olive da mensa, corrisponde alla comparsa delle prime punture, per le olive da olio risulta pari al 4-5% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve). Si allega il Disciplinare di Difesa Integrata 2024 dell'Olivo per la Regione Puglia

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 8

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

02/09/2024 - 08/09/2024



COMPENSORIO - BR - COLLINA LITORANEA

BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
CELLINO SAN MARCO
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
ORIA
OSTUNI
SAN DONACI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
TORRE SANTA SUSANNA
VILLA CASTELLI
SAN GIORGIO IONICO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	16	3	5%	PEGGIORAMENTO	MEDIO

PREVISIONI METEO

02/09/2024	03/09/2024	04/09/2024	05/09/2024	06/09/2024	07/09/2024	08/09/2024

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Sulla base dei dati osservati dal monitoraggio settimanale sul grado d'infestazione della mosca dell'olivo (*bractocera oleae*), rileviamo un leggero aumento delle catture di adulti di mosca nelle trappole attrattive e dalla elaborazione dei dati scaturiti dal campionamento diretto delle drupe, notiamo che le percentuali di infestazione sono leggermente cresciute rispetto alla settimana precedente e nelle zone costiere e in campi irrigui in pochi casi hanno raggiunto la soglia d'intervento.

Si ritiene pertanto giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario, principalmente negli oliveti irrigui e/o ubicati lungo la fascia costiera.

Si consiglia di intervenire con prodotti a base di acetamiprid, upyradifurone; in alternativa è possibile intervenire, preventivamente con trattamenti adulticidi, impiegando esche proteiche attivate con un insetticida autorizzato. All'aumento delle catture sulle trappole si possono utilizzare, in maniera preventiva, caolino o zeolite per creare una barriera protettiva come deterrente per l'ovideposizione. Ricordiamo che la soglia d'intervento, per le olive da mensa, corrisponde alla comparsa delle prime punture, per le olive da olio risulta pari al 4-5% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve).

Si allega il Disciplinare di Difesa Integrata 2024 dell'Olivo per la Regione Puglia

METODI DI LOTTA

Di seguito si elencano i metodi di lotta preventivi e curativi indicati nel Disciplinare di Difesa Integrata Olivo 2024

Mosca delle olive (Bactrocera oleae)	SOGLIA DI INTERVENTO • Per le olive da tavola: quando si nota la presenzadelle prime punture. • Per le olive da olio: in funzione delle varietà 4-5% diinfestazione attiva (sommatoria di uova e larve) INTERVENTI CHIMICI Nelle olive da mensa anche la sola puntura può determinare deformazione della drupa, pertanto l'intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture. Nelle olive da olio effettuare interventi: - preventivi (adulticidi) esclusivamente utilizzando esche proteiche attivate con formulati specifici autorizzati a base di deltametrina, spinosad o acetamiprid eventualmente innescati con feromone, o istallando trappole per la cattura massale - curativi (nei confronti delle larve) al raggiungimento della soglia, intervenire nei confronti nelle prime fasi di sviluppo della mosca (uovo e larva di 1° età) CAOLINO-ZEOLITE- repellente	<i>Opius concolor</i> <i>Beauveria bassiana</i> Cattura massale Sistemi tipo attact end kill Acetamiprid Carenza 21 gg Flupyradifurone Carenza 14 gg "Exirel Bait" a base della s.a. cyantraniliprole Carenza 7 gg	lanci da programmare con i centri diassistenza tecnica solo formulato con specifica esca prontaall'uso Numero massimo 2 intervento l'anno* (Non ammesso in agricoltura biologica) Numero massimo 1 intervento l'anno* (Non ammesso in agricoltura biologica) Numero massimo 3 interventi l'anno* (Non ammesso in agricoltura biologica) * A prescindere dall'avversità
---	---	--	--