


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 5

PERIODO DI VALIDITA':

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

11/07/2022 - 17/07/2022



COMPRENSORIO - LE - PIANURA SALENTINA NORD

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
CAVALLINO
COPERTINO
LECCE
LIZZANELLO
MONTERONI DI LECCE

NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TREPuzzi
VEGLIE
VERNOLE

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INDURIMENTO DEL NOCCIOLO	14	1	9%	MIGLIORAMENTO	MEDIO

PREVISIONI METEO

						
11/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	16/07/2022	17/07/2022

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


Nel comprensorio, l'attività della tignola dell'olivo (*prays oleae*) questa settimana risulta stazionaria e in alcune zone si è riscontrata una diminuzione. Dalla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio settimanale, riscontriamo la cattura di un basso numero di insetti adulti per trappola e con attività ovodeponente del lepidottero in diminuzione nella maggior parte dei punti di rilevamento. Il quadro generale parla di una media di 14 individui. Alla luce di quanto rilevato, nell'areale di riferimento non si ritiene giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 5

PERIODO DI VALIDITA':

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

11/07/2022 - 17/07/2022



COMPENSORIO - LE - PIANURA SALENTINA SUD

ACQUARICA DEL CAPO	MELENDUGNO
ALEZIO	MELISSANO
CANNOLE	MINERVINO DI LECCE
CARPIGNANO SALENTINO	NOCIGLIA
CASARANO	OTRANTO
GALLIPOLI	PALMARIGGI
GIUGGIANELLO	POGGIARDO
GIURDIGNANO	PRESICCE
MARTANO	RUFFANO
MATINO	SALVE
	SAN CASSIANO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INDURIMENTO DEL NOCCIOLO	17	1	9%	MIGLIORAMENTO	MEDIO

PREVISIONI METEO

						
11/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	16/07/2022	17/07/2022

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


Nel comprensorio, l'attività della tignola dell'olivo (*prays oleae*) questa settimana risulta stazionaria e in alcune zone si è riscontrata una diminuzione. Dalla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio settimanale, riscontriamo la cattura di un basso numero di insetti adulti per trappola e con attività ovodeponente del lepidottero in diminuzione nella maggior parte dei punti di rilevamento. Il quadro generale parla di una media di 17 individui. Alla luce di quanto rilevato, nell'areale di riferimento non si ritiene giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 5

PERIODO DI VALIDITA':

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

11/07/2022 - 17/07/2022



COMPRENSORIO - TA - PIANURA DI TARANTO

CASTELLANETA
CRISPIANO
FAGGIANO
GINOSA
GROTTAGLIE
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MARUGGIO
MASSAFRA
MONTEIASI

MONTEMESOLA
MOTTOLA
PALAGIANELLO
STATTE
TARANTO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INDURIMENTO DEL NOCCIOLO	22	3	9%	STAZIONARIO	MEDIO

PREVISIONI METEO

						
11/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	16/07/2022	17/07/2022

SUGGERIMENTI FITOSANITARI


Nel comprensorio, l'attività della tignola dell'olivo (*prays oleae*) questa settimana risulta stazionaria e in alcune zone si è riscontrata una diminuzione. Dalla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio settimanale, riscontriamo la cattura di un basso numero di insetti adulti per trappola e con attività ovodeponente del lepidottero in diminuzione nella maggior parte dei punti di rilevamento. Il quadro generale parla di una media di 22 individui. Alla luce di quanto rilevato, nell'areale di riferimento non si ritiene giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario.

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 5

PERIODO DI VALIDITA':

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

11/07/2022 - 17/07/2022



COMPENSORIO - BR - COLLINA LITORANEA

BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
CELLINO SAN MARCO
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
ORIA
OSTUNI
SAN DONACI

SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
TORRE SANTA SUSANNA
VILLA CASTELLI

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INDURIMENTO DEL NOCCIOLO	22	2	9%	MIGLIORAMENTO	MEDIO

PREVISIONI METEO

						
11/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	16/07/2022	17/07/2022

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Nel comprensorio, l'attività della tignola dell'olivo (*prays oleae*) questa settimana risulta stazionaria e in alcune zone si è riscontrata una diminuzione. Dalla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio settimanale, riscontriamo la cattura di un basso numero di insetti adulti per trappola e con attività ovodeponente del lepidottero in diminuzione nella maggior parte dei punti di rilevamento. Il quadro generale parla di una media di 22 individui. Alla luce di quanto rilevato, nell'areale di riferimento non si ritiene giustificata l'esecuzione di un trattamento fitosanitario.

Difesa integrata di: Olivo Puglia 2022

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	(1)	(2)	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
FITOFAGI Tignola dell'olivo (<i>Prays oleae</i>)	<u>Soglia di intervento (solo per la generazione carpofaga)</u> • Per le olive da olio: 10 - 15% di uova e/o di larvette in fase di penetrazione nelle olivine. • Per le olive da tavola: 5 - 7 % <u>Interventi chimici: solo per la generazione carpofaga e per varietà a drupa grossa</u> Intervenire quasi alla fine della curva di volo della generazione antofaga determinata con le trappole a feromone e comunque prima dell'indurimento del nocciolo al superamento della soglia di intervento	Fosmet		2	*Fosmet impiegabile fino al 1/11/2022
		<i>Bacillus thuringiensis</i>			
		Acetamiprid		2	
		Spinetoram	1	2	
Mosca delle olive (<i>Bactrocera oleae</i>)	<u>Soglia di intervento</u> Per le olive da tavola: quando si nota la presenza delle prime punture Per le olive da olio: in funzione delle varietà 5-7% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve) <u>Interventi chimici</u> Nelle olive da mensa anche la sola puntura può determinare deformazione della drupa, pertanto l'intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture. Nelle olive da olio effettuare interventi: - <u>preventivi (adulticidi): esclusivamente</u> utilizzando esche proteiche attivate con formulati specifici autorizzati a base di deltametrina, spinosad o acetamiprid, eventualmente innescati con feromone, o installando trappole per la cattura massale - <u>curativi (nei confronti delle larve):</u> al raggiungimento della soglia, intervenire nei confronti delle prime fasi di sviluppo della mosca (uovo e larva di prima età).	<i>Opius concolor</i>	(*)		(*) lanci da programmare con i centri di assistenza tecnica
		<i>Beauveria bassiana</i>			
		Cattura massale			
		Sistemi tipo attract and kill		(*)	(*) per interventi preventivi adulticidi, secondo quanto riportato nei criteri d'intervento
		Fosmet		2*	(*) Per interventi curativi, secondo quanto riportato nei criteri d'intervento
		Acetamiprid		2*	(*) Per interventi curativi, secondo quanto riportato nei criteri d'intervento
Oziorrinco (<i>Otiorrhynchus cribricollis</i>)	<u>Interventi agronomici</u> Su piante adulte lasciare alla base del tronco i polloni e sul tronco e sulle branche i succhioni, sui quali si soffermano gli adulti. Collocare intorno al tronco delle fasce di resinato o manicotti di plastica per impedire la salita degli adulti nel periodo di massima attività dell'insetto (maggio - giugno e settembre - ottobre).				

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
 (2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità