Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

UNASCO

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 12

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 25/09/2018 - 01/10/2018

PROVINCIA DI: LECCE

Comprenso PIANURA DI LECCE NORD

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
CAVALLINO
COPERTINO
GALATINA
LECCE
LIZZANELLO
MONTERONI DI LECCE
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TORCHIAROLO
TREPUZZI
VEGLIE
VERNOLE

Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Invaiatura

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
PIANURA DI LECCE NORD	11,91	6,27	10 %	⬇	

Suggerimenti Fitosanitari

Il grado d'infestazione di mosca dell'olivo (Bractocera oleae) rilevata dalla nostra attività di monitoraggio settimanale risulta in ulteriore peggioramento con aumento di catture di adulti e di punture fertili su tutte le varietà.
Sulle varietà a drupa grossa si è raggiunto il 10% delle olive campionate, mentre su oliveti di varietà a drupa piccola (ogliarola salentina e cellina di Nardò) si riscontrano valori ancora variabili in funzione principalmente dell'ubicazione dell'oliveto (in zone costiere o umide il grado d'infestazione è risultato più elevato e si raggiunge in molti casi la soglia del 10%).
Si consiglia pertanto di intervenire sia sulle varietà a drupa grossa che sulle varietà tradizionali a drupa piccola ubicate in zone costiere e/o umide, ad eccezione di chi ha già effettuato il trattamento nelle precedenti settimane e prestando estrema attenzione all'intervallo di sicurezza del prodotto utilizzato in funzione del periodo di raccolta programmato.
Utilizzare, in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, Acetamiprid con numero massimo di trattamenti per singolo principio attivo secondo quanto previsto dalle norme di difesa integrata.

PREVISIONI METEREOLOGICHE



Situazione delle temperature in Italia al 01/10/2018

Tendenza della nuvolosità fino al 01/10/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

1/10/2018	2/10/2018	3/10/2018
Max 24 Min 19	Max 25 Min 18	Max 23 Min 18
Parzialmente soleggiato	**Prevalentemente nuvoloso con temporali**	Parzialmente soleggiato con temporali

4/10/2018	5/10/2018	//
Min 18 Max 24	Min 19 Max 24	Min Max
Parzialmente soleggiato con temporali	Parzialmente soleggiato con temporali	

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

UNASCO

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 12

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 25/09/2018 - 01/10/2018

PROVINCIA DI: LECCE

Comprensorio: PIANURA SALENTINA SUD

ACQUARICA DEL CAPO
ALEZIO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
GALLIPOLI
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LEQUILE
MARTANO
MATINO
MELENDUGNO
MELISSANO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SAN CASSIANO
SANARICA
SANTA CESAREA TERME
SCORRANO
SPONGANO SUPERSANO
TAURISANO UGENTO
VERNOLE

Il Tecnico:
FRANCESCO MARIANO - Cellulare: 3206389916

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Invaiatura

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
LE PIANURA SALENTINA SUD	14,89	7,7	10 %	⬇	

Suggerimenti Fitosanitari

Il grado d'infestazione di mosca dell'olivo (Bractocera oleae) rilevata dalla nostra attività di monitoraggio settimanale risulta in ulteriore peggioramento con aumento di catture di adulti e di punture fertili su tutte le varietà.
Sulle varietà a drupa grossa si è raggiunto il 10% delle olive campionate, mentre su oliveti di varietà a drupa piccola (ogliarola salentina e cellina di Nardò) si riscontrano valori ancora variabili in funzione principalmente dell'ubicazione dell'oliveto (in zone costiere o umide il grado d'infestazione è risultato più elevato e si raggiunge in molti casi la soglia del 10%).
Si consiglia pertanto di intervenire sia sulle varietà a drupa grossa che sulle varietà tradizionali a drupa piccola ubicate in zone costiere e/o umide, ad eccezione di chi ha già effettuato il trattamento nelle precedenti settimane e prestando estrema attenzione all'intervallo di sicurezza del prodotto utilizzato in funzione del periodo di raccolta programmato.
Utilizzare, in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, Acetamiprid con numero massimo di trattamenti per singolo principio attivo secondo quanto previsto dalle norme di difesa integrata.

PREVISIONI METEREOLOGICHE



Situazione delle temperature in Italia al 01/10/2018

Tendenza della nuvolosità fino al 01/10/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

1/10/2018	2/10/2018	3/10/2018
Max 25 Min 17	Max 25 Min 16	Max 23 Min 16
Parzialmente soleggiato	**Prevalentemente nuvoloso con temporali**	Parzialmente soleggiato con temporali

4/10/2018	5/10/2018	//
Min 17 Max 23	Min 18 Max 23	Min Max
Parzialmente soleggiato con temporali	Parzialmente soleggiato con temporali	

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

UNASCO

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 12

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 25/09/2018 - 01/10/2018

PROVINCIA DI: BRINDISI

Comprensorio: BR COLLINA LITORANEA

BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
LATIANO
MESAGNE
ORIA
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
TORRE SANTA SUSANNA
VILLA CASTELLI

Il Tecnico:
FEDERICO GALLONE - Cellulare: 3396517097

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Invaiatura

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
BR COLLINA LITORANEA	12,9	7,54	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il grado d'infestazione di mosca dell'olivo (Bractocera oleae) rilevata dalla nostra attività di monitoraggio settimanale risulta sostanzialmente stazionario e di estremo rilievo.
Sulle varietà a drupa grossa si è raggiunto da tempo il 10% delle olive campionate, mentre su oliveti di varietà a drupa piccola (ogliarola salentina e cellina di Nardò) si riscontrano valori ancora variabili in funzione principalmente dell'ubicazione dell'oliveto (in zone collinari o umide il grado d'infestazione è risultato più elevato e si raggiunge in molti casi la soglia del 10%).
Si consiglia pertanto di intervenire sia sulle varietà a drupa grossa che sulle varietà tradizionali a drupa piccola ubicate in zone collinari e/o umide, ad eccezione di chi ha già effettuato il trattamento nelle precedenti settimane e prestando estrema attenzione all'intervallo di sicurezza del prodotto utilizzato in funzione del periodo di raccolta programmato
Utilizzare, in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, Acetamiprid con numero massimo di trattamenti per singolo principio attivo secondo quanto previsto dalle norme di difesa integrata.

PREVISIONI METEREOLOGICHE



Situazione delle temperature in Italia al 01/10/2018

Tendenza della nuvolosità fino al 01/10/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

1/10/2018	2/10/2018	3/10/2018
Max 24 Min 15	Max 24 Min 17	Max 21 Min 17
Parzialmente soleggiato	**Prevalentemente nuvoloso con temporali**	Parzialmente soleggiato con temporali

4/10/2018	5/10/2018	//
Min 17 Max 22	Min 18 Max 23	Min Max
Parzialmente soleggiato con temporali	Parzialmente soleggiato con temporali	

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

UNASCO

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 12

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 25/09/2018 - 01/10/2018

PROVINCIA DI: TARANTO



Comprensorio: PIANURA DI TARANTO

CASTELLANETA
CRISPIANO
FAGGIANO
GINOSA
GROTTAGLIE
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MARUGGIO
MASSAFRA
MONTEIASI
MONTEMESOLA
MOTTOLA
PALAGIANELLO
STATTE
TARANTO

Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Invaiatura

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
PIANURA DI TARANTO	8,3	6,17	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Anche questa settimana il grado d'infestazione di mosca dell'olivo (Bractocera oleae) rilevata dalla nostra attività di monitoraggio risulta di estremo rilievo con percentuale di punture fertili che in alcuni casi e in particolare sulle varietà a drupa grossa, raggiunge il 10% delle olive campionate. Su oliveti di varietà tradizionali si riscontrano valori variabili in funzione principalmente dell'ubicazione dell'oliveto (in zone collinari o umide il grado d'infestazione è risultato più elevato e a ridosso del 10%).
Si consiglia pertanto di intervenire sia sulle varietà a drupa grossa che sulle varietà tradizionali a drupa piccola ubicate in zone collinari e/o umide, ad eccezione di chi ha già effettuato il trattamento nelle precedenti settimane e prestando estrema attenzione al rispetto dell'intervallo di sicurezza del prodotto utilizzato in funzione del periodo di raccolta programmato.
Utilizzare, in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, Acetamiprid con numero massimo di trattamenti per singolo principio attivo secondo quanto previsto dalle norme di difesa integrata.

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

UNASCO

PREVISIONI METEREOLOGICHE



Situazione delle temperature in Italia al 01/10/2018

Tendenza della nuvolosità fino al 01/10/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

1/10/2018	2/10/2018	3/10/2018
Max 24 Min 16	Max 25 Min 18	Max 23 Min 18
Parzialmente soleggiato	**Prevalentemente nuvoloso con temporali**	Parzialmente soleggiato con temporali

4/10/2018	5/10/2018	//
Min 18 Max 24	Min 19 Max 23	Min Max
Parzialmente soleggiato con temporali	Parzialmente soleggiato con temporali	