



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 13

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 02/10/2017 - 06/10/2017

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: P.ra di Lecce Nord

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
COPERTINO
LECCE
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TORCHIAROLO
TREPZZI
VEGLIE



Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Invaiaitura

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra di Lecce Nord	5,61	1,39	10 %	↓	

Suggerimenti Fitosanitari

Il livello di infestazione della mosca dell'olivo (*bactrocera oleae*) risulta complessivamente in leggero aumento rispetto alla settimana precedente; Nel dettaglio, il nostro monitoraggio settimanale evidenzia la seguente situazione:

- sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina) si riscontra ancora bassa presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassa percentuale di olive attaccate;
- sulle varietà a drupa grossa sia il numero di catture che le punture sulle olive risultano in sensibile aumento, con casi di attacchi di mosca su oliveti ubicati in zone costiere che hanno superato la soglia d'intervento (pari al 10% sulle varietà da olio).

Pertanto, anche questa settimana, ad eccezione degli oliveti a drupa grossa, irrigui e ubicati in zone costiere, non è necessario procedere ad alcun intervento fitosanitario.

Tuttavia, consigliamo di prestare molta attenzione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue, considerando sia l'evoluzione dell'infestazione che eventuali situazioni particolari menzionate. Nel caso fosse necessario intervenire, si raccomanda di utilizzare tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad (Spintor Fly), ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, rispettando il periodo di carenza (intervallo di sicurezza) in base all'epoca di raccolta prevista.

Si segnala negli oliveti anche la presenza di lebbra, occhio di pavone, cercosporiosi e margaronia da combattere con prodotti rameici e comunque indicati nel nostro disciplinare di coltivazione integrata dell'olivo basato sulle indicazioni riportate dalle "norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria" 2017 della Regione Puglia tenendo conto sempre il periodo di carenza.




Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
06/10/2017

Tendenza della nuvolosità
fino al 11/10/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

6/10/2017



Max 26
Min 14

Sereno

7/10/2017



Max 18
Min 13

Possibilita' di pioggia

8/10/2017



Max 21
Min 12

Sereno

9/10/2017



Min 13
Max 23

Sereno

10/10/2017



Min 14
Max 23

Possibilita' di pioggia

11/10/2017



Min 15
Max 23

Parzialmente nuvoloso



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 13

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 02/10/2017 - 06/10/2017

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: P.ra Salentina Centr

ACQUARICA DEL CAPO	OTRANTO
CANNOLE	PALMARIGGI
CARPIGNANO SALENTINO	POGGIARDO
CASARANO	PRESICCE
CAVALLINO GIUGGIANELLO	RUFFANO
GIURDIGNANO	SAN CASSIANO
LECCE	SANARICA
LIZZANELLO	SANTA CESAREA TERME
MARTANO	SCORRANO
MELENDUGNO	SPONGANO
MELISSANO	UGENTO
MINERVINO DI LECCE	VERNOLE
NOCIGLIA	



Il Tecnico:
FRANCESCO MARIANO - Cellulare: 3206389916

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Invaiaitura

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra Salentina Centr	9,61	1,71	10 %	↓	

Suggerimenti Fitosanitari

Il livello di infestazione della mosca dell'olivo (*bactrocera oleae*) risulta complessivamente in leggero aumento rispetto alla settimana precedente; Nel dettaglio, il nostro monitoraggio settimanale evidenzia la seguente situazione:

- sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina) si riscontra ancora bassa presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassa percentuale di olive attaccate;
- sulle varietà a drupa grossa sia il numero di catture che le punture sulle olive risultano in sensibile aumento, con casi di attacchi di mosca su oliveti ubicati in zone costiere che hanno superato la soglia d'intervento (pari al 10% sulle varietà da olio).

Pertanto, anche questa settimana, ad eccezione degli oliveti a drupa grossa, irrigui e ubicati in zone costiere, non è necessario procedere ad alcun intervento fitosanitario.

Tuttavia, consigliamo di prestare molta attenzione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue, considerando sia l'evoluzione dell'infestazione che eventuali situazioni particolari menzionate. Nel caso fosse necessario intervenire, si raccomanda di utilizzare tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad (Spintor Fly), ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, rispettando il periodo di carenza (intervallo di sicurezza) in base all'epoca di raccolta prevista.

Si segnala negli oliveti anche la presenza di lebbra, occhio di pavone, cercosporiosi e margaronia da combattere con prodotti rameici e comunque indicati nel nostro disciplinare di coltivazione integrata dell'olivo basato sulle indicazioni riportate dalle "norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria" 2017 della Regione Puglia tenendo conto sempre il periodo di carenza.




Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
06/10/2017

Tendenza della nuvolosità
fino al 11/10/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

6/10/2017



Max 24
Min 21

Sereno

7/10/2017



Max 19
Min 15

Possibilita' di temporale

8/10/2017



Max 21
Min 14

Sereno

9/10/2017



Min 14
Max 22

Parzialmente nuvoloso

10/10/2017



Min 15
Max 21

Possibilita' di pioggia

11/10/2017



Min 16
Max 21

Possibilita' di pioggia



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 13

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 02/10/2017 - 06/10/2017

PROVINCIA DI: BRINDISI



Comprensorio: Collina Litoranea Br

CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
VILLA CASTELLI



Il Tecnico:
RAFFAELE DEGIOVANNI - Cellulare: 3388912796

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Invaiaatura

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Collina Litoranea Br	7,25	1,03	10 %	↓	

Suggerimenti Fitosanitari

Il livello di infestazione della mosca dell'olivo (*bactrocera oleae*) risulta complessivamente in leggero aumento rispetto alla settimana precedente; Nel dettaglio, il nostro monitoraggio settimanale evidenzia la seguente situazione:

- sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina) si riscontra ancora bassa presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassa percentuale di olive attaccate;
- sulle varietà a drupa grossa sia il numero di catture che le punture sulle olive risultano in sensibile aumento, con casi di attacchi di mosca su oliveti ubicati in zone costiere che hanno superato la soglia d'intervento (pari al 10% sulle varietà da olio).

Pertanto, anche questa settimana, ad eccezione degli oliveti a drupa grossa, irrigui e ubicati in zone costiere, non è necessario procedere ad alcun intervento fitosanitario.

Tuttavia, consigliamo di prestare molta attenzione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue, considerando sia l'evoluzione dell'infestazione che eventuali situazioni particolari menzionate. Nel caso fosse necessario intervenire, si raccomanda di utilizzare tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad (Spintor Fly), ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, rispettando il periodo di carenza (intervallo di sicurezza) in base all'epoca di raccolta prevista.

Si segnala negli oliveti anche la presenza di lebbra, occhio di pavone, cercosporiosi e margaronia da combattere con prodotti rameici e comunque indicati nel nostro disciplinare di coltivazione integrata dell'olivo basato sulle indicazioni riportate dalle "norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria" 2017 della Regione Puglia tenendo conto sempre il periodo di carenza.




Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
06/10/2017

Tendenza della nuvolosità
fino al 11/10/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

6/10/2017

Max 24
Min 12



Sereno

7/10/2017

Max 17
Min 12



Possibilita' di pioggia

8/10/2017

Max 19
Min 12



Sereno

9/10/2017

Min 13
Max 21



Sereno

10/10/2017

Min 14
Max 22



Possibilita' di pioggia

11/10/2017

Min 14
Max 22



Sereno



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 13

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 02/10/2017 - 06/10/2017

PROVINCIA DI: BARI



Comprensorio: Pianura Bari Sud

BINETTO
CASTELLANA GROTTA
CONVERSANO



Il Tecnico:
MASSIMILIANO DESANTIS - Cellulare: 3281498066

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoltori
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Invaiaitura

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura Bari Sud	7,82	1,86	10 %	↓	

Suggerimenti Fitosanitari

Il livello di infestazione della mosca dell'olivo (*bactrocera oleae*) risulta complessivamente in leggero aumento rispetto alla settimana precedente; Nel dettaglio, il nostro monitoraggio settimanale evidenzia la seguente situazione:

- sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina) si riscontra ancora bassa presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassa percentuale di olive attaccate;
- sulle varietà a drupa grossa sia il numero di catture che le punture sulle olive risultano in sensibile aumento, con casi di attacchi di mosca su oliveti ubicati in zone costiere che hanno superato la soglia d'intervento (pari al 10% sulle varietà da olio).

Pertanto, anche questa settimana, ad eccezione degli oliveti a drupa grossa, irrigui e ubicati in zone costiere, non è necessario procedere ad alcun intervento fitosanitario.

Tuttavia, consigliamo di prestare molta attenzione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue, considerando sia l'evoluzione dell'infestazione che eventuali situazioni particolari menzionate. Nel caso fosse necessario intervenire, si raccomanda di utilizzare tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad (Spintor Fly), ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, rispettando il periodo di carenza (intervallo di sicurezza) in base all'epoca di raccolta prevista.

Si segnala negli oliveti anche la presenza di lebbra, occhio di pavone, cercosporiosi e margaronia da combattere con prodotti rameici e comunque indicati nel nostro disciplinare di coltivazione integrata dell'olivo basato sulle indicazioni riportate dalle "norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria" 2017 della Regione Puglia tenendo conto sempre il periodo di carenza.




Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
06/10/2017

Tendenza della nuvolosità
fino al 11/10/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

6/10/2017

Max 25
Min 16



Sereno

7/10/2017

Max 16
Min 12



Possibilita' di pioggia

8/10/2017

Max 20
Min 11



Sereno

9/10/2017

Min 12
Max 20



Sereno

10/10/2017

Min 14
Max 20



Possibilita' di pioggia

11/10/2017

Min 14
Max 20



Parzialmente nuvoloso



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 13

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 02/10/2017 - 06/10/2017

PROVINCIA DI: TARANTO



Comprensorio: **Pianura di Taranto**

CASTELLANETA
CRISPIANO
GINOSA
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MASSAFRA
MOTTOLA
PALAGIANELLO



Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Invaiaitura

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura di Taranto	4,5	1,81	10 %	↓	

Suggerimenti Fitosanitari

Il livello di infestazione della mosca dell'olivo (*bactrocera oleae*) risulta complessivamente in leggero aumento rispetto alla settimana precedente; Nel dettaglio, il nostro monitoraggio settimanale evidenzia la seguente situazione:

- sulle varietà a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina) si riscontra ancora bassa presenza di catture di adulti sulle trappole cromotropiche a feromone e bassa percentuale di olive attaccate;
- sulle varietà a drupa grossa sia il numero di catture che le punture sulle olive risultano in sensibile aumento, con casi di attacchi di mosca su oliveti ubicati in zone costiere che hanno superato la soglia d'intervento (pari al 10% sulle varietà da olio).

Pertanto, anche questa settimana, ad eccezione degli oliveti a drupa grossa, irrigui e ubicati in zone costiere, non è necessario procedere ad alcun intervento fitosanitario.

Tuttavia, consigliamo di prestare molta attenzione, soprattutto sulle varietà a drupa grossa e irrigue, considerando sia l'evoluzione dell'infestazione che eventuali situazioni particolari menzionate. Nel caso fosse necessario intervenire, si raccomanda di utilizzare tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad (Spintor Fly), ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, rispettando il periodo di carenza (intervallo di sicurezza) in base all'epoca di raccolta prevista.

Si segnala negli oliveti anche la presenza di lebbra, occhio di pavone, cercosporiosi e margaronia da combattere con prodotti rameici e comunque indicati nel nostro disciplinare di coltivazione integrata dell'olivo basato sulle indicazioni riportate dalle "norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria" 2017 della Regione Puglia tenendo conto sempre il periodo di carenza.




Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
06/10/2017

Tendenza della nuvolosità
fino al 11/10/2017

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

6/10/2017



Max 26
Min 14

Sereno

7/10/2017



Max 21
Min 13

Parzialmente nuvoloso

8/10/2017



Max 23
Min 14

Sereno

9/10/2017



Min 16
Max 23

Sereno

10/10/2017



Min 16
Max 23

Sereno

11/10/2017



Min 16
Max 24

Sereno