

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 13

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 02/10/2018 - 08/10/2018

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio

PIANURA DI LECCE NORD

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
CAVALLINO
COPERTINO
GALATINA
LECCE
LIZZANELLO
MONTERONI DI LECCE
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TORCHIAROLO
TREPuzzi
VEGLIE
VERNOLE




Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Maturazione

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
PIANURA DI LECCE NORD	16,47	10,53	10 %	↓	

Suggerimenti Fitosanitari


Dal nostro monitoraggio settimanale si riscontra un grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*Bractocera oleae*) in ulteriore sensibile peggioramento rispetto a sette giorni addietro con maggior numero di catture di adulti e di punture fertili su tutte le varietà.

Sulle varietà a drupa grossa si è da tempo raggiunto il 10% di infestazione sulle olive campionate, mentre su oliveti di varietà a drupa piccola (ogliarola salentina e cellina di Nardò) si riscontrano in media valori oramai a ridosso di tale soglia d'intervento (in zone costiere o umide il grado d'infestazione è risultato più elevato e si raggiunge in molti casi la soglia del 10%).

Si consiglia pertanto di intervenire sia sulle varietà a drupa grossa che sulle varietà tradizionali a drupa piccola ubicate in zone costiere e/o umide, ad eccezione di chi ha già effettuato il trattamento nelle precedenti settimane e prestando estrema attenzione all'intervallo di sicurezza del prodotto utilizzato in funzione del periodo di raccolta programmato.

Utilizzare, in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, Acetamiprid con numero massimo di trattamenti per singolo principio attivo secondo quanto previsto dalle norme di difesa integrata.

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
08/10/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 08/10/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

8/10/2018

Max 23
Min 17



Parzialmente soleggiato con temporali

9/10/2018

Max 23
Min 17



Parzialmente soleggiato con temporali

10/10/2018

Max 24
Min 15



Parzialmente soleggiato

11/10/2018

Min 15
Max 24



Prevalentemente soleggiato

12/10/2018

Min 16
Max 24



Parzialmente soleggiato

//

Min
Max



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA



BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 13

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 02/10/2018 - 08/10/2018

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: **PIANURA SALENTINA SUD**

ACQUARICA DEL CAPO
ALEZIO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
GALLIPOLI
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LEQUILE
MARTANO
MATINO
MELENDUGNO
MELISSANO MINERVINO
DI LECCE NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI

POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SAN CASSIANO
SANARICA
SANTA CESAREA TERME
SCORRANO
SPONGANO SUPERSANO
TAURISANO UGENTO
VERNOLE




Il Tecnico:
FRANCESCO MARIANO - Cellulare: 3206389916

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Maturazione

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
PIANURA SALENTINA SUD	18,04	9,72	10 %	↓	

Suggerimenti Fitosanitari


Dal nostro monitoraggio settimanale si riscontra un grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*Bractocera oleae*) in ulteriore sensibile peggioramento rispetto a sette giorni addietro con maggior numero di catture di adulti e di punture fertili su tutte le varietà.

Sulle varietà a drupa grossa si è da tempo raggiunto il 10% di infestazione sulle olive campionate, mentre su oliveti di varietà a drupa piccola (ogliarola salentina e cellina di Nardò) si riscontrano in media valori oramai a ridosso di tale soglia d'intervento (in zone costiere o umide il grado d'infestazione è risultato più elevato e si raggiunge in molti casi la soglia del 10%).

Si consiglia pertanto di intervenire sia sulle varietà a drupa grossa che sulle varietà tradizionali a drupa piccola ubicate in zone costiere e/o umide, ad eccezione di chi ha già effettuato il trattamento nelle precedenti settimane e prestando estrema attenzione all'intervallo di sicurezza del prodotto utilizzato in funzione del periodo di raccolta programmato.

Utilizzare, in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, Acetamiprid con numero massimo di trattamenti per singolo principio attivo secondo quanto previsto dalle norme di difesa integrata.

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
08/10/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 08/10/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

8/10/2018

Max 24
Min 14



Parzialmente soleggiato con temporali

9/10/2018

Max 23
Min 14



Parzialmente soleggiato con temporali

10/10/2018

Max 23
Min 14



Parzialmente soleggiato

11/10/2018

Min 14
Max 23



Prevalentemente soleggiato

12/10/2018

Min 15
Max 23



Parzialmente soleggiato

//

Min
Max



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA



BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 13

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 02/10/2018 - 08/10/2018

PROVINCIA DI: BRINDISI



Comprensorio: BR COLLINA LITORANEA

BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
LATIANO
MESAGNE
ORIA
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
TORRE SANTA SUSANNA
VILLA CASTELLI



Il Tecnico:
FEDERICO GALLONE - Cellulare: 3396517097

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Maturazione

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
BR COLLINA LITORANEA	22,17	8,45	10 %	↓	

Suggerimenti Fitosanitari


Anche questa settimana si conferma un grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*Bractocera oleae*) di estremo rilievo.

I dati del nostro monitoraggio rilevano infatti sulle varietà a drupa grossa il superamento del 10% sulle olive campionate, mentre su oliveti di varietà a drupa piccola (oglierola salentina e cellina di Nardò) i valori riscontrati sono nella media oramai a ridosso di tale soglia d'intervento (in zone collinari o umide il grado d'infestazione è risultato più elevato e si raggiunge in molti casi la soglia del 10%).

Si consiglia pertanto di intervenire sia sulle varietà a drupa grossa che sulle varietà tradizionali a drupa piccola ubicate in zone collinari e/o umide, ad eccezione di chi ha già effettuato il trattamento nelle precedenti settimane e prestando estrema attenzione all'intervallo di sicurezza del prodotto utilizzato in funzione del periodo di raccolta programmato.

Utilizzare, in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, Acetamiprid con numero massimo di trattamenti per singolo principio attivo secondo quanto previsto dalle norme di difesa integrata.

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
08/10/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 08/10/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

8/10/2018

Max 22
Min 16



Parzialmente soleggiato con temporali

9/10/2018

Max 23
Min 15



Parzialmente soleggiato con temporali

10/10/2018

Max 23
Min 14



Parzialmente soleggiato con temporali

11/10/2018

Min 14
Max 24



Prevalentemente soleggiato

12/10/2018

Min 13
Max 23



Parzialmente soleggiato

//

Min
Max



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA




BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 13

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 02/10/2018 - 08/10/2018

PROVINCIA DI: TARANTO



Comprensorio: PIANURA DI TARANTO

CASTELLANETA
CRISPANO
FAGGIANO
GINOSA
GROTTAGLIE
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MARUGGIO
MASSAFRA
MONTEIASI
MONTEMESOLA
MOTTOLA
PALAGIANELLO
STATTE
TARANTO




Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Maturazione

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
TA PIANURA DI TARANTO	15,53	8,58	10 %	↓	


Suggerimenti Fitosanitari

Dal nostro monitoraggio settimanale si riscontra un grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*Bractocera oleae*) di estremo rilievo con percentuale di punture fertili che in alcuni casi e in particolare sulle varietà a drupa grossa, raggiunge il 10% delle olive campionate. Su oliveti di varietà tradizionali i valori riscontrati sono nella media oramai a ridosso di tale soglia d'intervento (in zone collinari o umide il grado d'infestazione è risultato più elevato).

Si consiglia pertanto di intervenire sia sulle varietà a drupa grossa che sulle varietà tradizionali a drupa piccola ubicate in zone collinari e/o umide, ad eccezione di chi ha già effettuato il trattamento nelle precedenti settimane e prestando estrema attenzione al rispetto dell'intervallo di sicurezza del prodotto utilizzato in funzione del periodo di raccolta programmato.

Utilizzare, in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, midacloprid, Fosmet, Acetamiprid con numero massimo di trattamenti per singolo principio attivo secondo quanto previsto dalle norme di difesa integrata.

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
08/10/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 08/10/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

8/10/2018

Max 24
Min 16



Parzialmente soleggiato con temporali

9/10/2018

Max 24
Min 16



Parzialmente soleggiato con temporali

10/10/2018

Max 24
Min 15



Parzialmente soleggiato con temporali

11/10/2018

Min 15
Max 23



Prevalentemente soleggiato

12/10/2018

Min 14
Max 24



Parzialmente soleggiato

//

Min
Max