

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 14

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 09/10/2018 - 15/10/2018

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio

PIANURA DI LECCE NORD

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
CAVALLINO
COPERTINO
GALATINA
LECCE
LIZZANELLO
MONTERONI DI LECCE
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TORCHIAROLO
TREPUIZZI
VEGLIE
VERNOLE




Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Maturazione

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
PIANURA DI LECCE NORD	17,61	8,9	10 %	↓	


Suggerimenti Fitosanitari

Il grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*Bractocera oleae*) rilevato dalla nostra attività di monitoraggio settimanale è estremamente rilevante con aumento di catture di adulti e di punture fertili su tutte le varietà. Sulle varietà a drupa grossa si è raggiunto ampiamente il 10% di olive attaccate, mentre su oliveti di varietà a drupa piccola (ogliarola salentina e cellina di Nardò) la percentuale di olive infette è in media a ridosso di tale soglia d'intervento.

Pertanto, compatibilmente con il periodo di carenza del prodotto utilizzato in funzione del periodo di raccolta programmato, si consiglia di intervenire sia sulle varietà a drupa grossa che sulle varietà tradizionali a drupa piccola che hanno raggiunto tale soglia d'intervento, ad eccezione, ovviamente, di chi ha già effettuato il trattamento nelle precedenti due-tre settimane.

Utilizzare, in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, Acetamiprid con numero massimo di trattamenti per singolo principio attivo secondo quanto previsto dalle norme di difesa integrata.

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
15/10/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 15/10/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

15/10/2018

Max 24
Min 18



Parzialmente soleggiato con temporali

16/10/2018

Max 24
Min 17



Nuvole intermittenti

17/10/2018

Max 23
Min 16



Nuvole intermittenti

18/10/2018

Min 16
Max 24



Parzialmente soleggiato

19/10/2018

Min 17
Max 24



Nuvole intermittenti

//

Min
Max



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA



BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 14

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 09/10/2018 - 15/10/2018

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: **PIANURA SALENTINA SUD**

ACQUARICA DEL CAPO
ALEZIO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
GALLIPOLI
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LEQUILE
MARTANO
MATINO
MELENDUGNO
MELISSANO MINERVINO
DI LECCE NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI

POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SAN CASSIANO
SANARICA
SANTA CESAREA TERME
SCORRANO
SPONGANO SUPERSANO
TAURISANO UGENTO
VERNOLE



Il Tecnico:
FRANCESCO MARIANO - Cellulare: 3206389916

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA



STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Maturazione

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
PIANURA SALENTINA SUD	16,57	7,98	10 %	↓	


Suggerimenti Fitosanitari

Il grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) rilevato dalla nostra attività di monitoraggio settimanale è estremamente rilevante con aumento di catture di adulti e di punture fertili su tutte le varietà. Sulle varietà a drupa grossa si è raggiunto ampiamente il 10% di olive attaccate, mentre su oliveti di varietà a drupa piccola (oglierola salentina e cellina di Nardò) la percentuale di olive infette è in media a ridosso di tale soglia d'intervento.

Pertanto, compatibilmente con il periodo di carenza del prodotto utilizzato in funzione del periodo di raccolta programmato, si consiglia di intervenire sia sulle varietà a drupa grossa che sulle varietà tradizionali a drupa piccola che hanno raggiunto tale soglia d'intervento, ad eccezione, ovviamente, di chi ha già effettuato il trattamento nelle precedenti due-tre settimane.

Utilizzare, in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, Acetamiprid con numero massimo di trattamenti per singolo principio attivo secondo quanto previsto dalle norme di difesa integrata.

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
15/10/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 15/10/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

15/10/2018

Max 24
Min 16



Parzialmente soleggiato con temporali

16/10/2018

Max 23
Min 15



Nuvole intermittenti

17/10/2018

Max 23
Min 14



Nuvole intermittenti

18/10/2018

Min 15
Max 24



Parzialmente soleggiato

19/10/2018

Min 15
Max 24



Nuvole intermittenti

//

Min
Max



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA



BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 14

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 09/10/2018 - 15/10/2018

PROVINCIA DI: BRINDISI



Comprensorio: BR COLLINA LITORANEA

BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
LATIANO
MESAGNE
ORIA
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
TORRE SANTA SUSANNA
VILLA CASTELLI




Il Tecnico:
FEDERICO GALLONE - Cellulare: 3396517097

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Maturazione

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
BR COLLINA LITORANEA	20,9	8,41	10 %	↓	


Suggerimenti Fitosanitari

Il grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*Bractocera oleae*) rilevato dalla nostra attività di monitoraggio settimanale è estremamente rilevante con elevato numero di catture di adulti e di punture fertili su tutte le varietà. Sulle varietà a drupa grossa si è da tempo raggiunto ampiamente il 10% di olive attaccate, mentre su oliveti di varietà a drupa piccola (ogliarola salentina e cellina di Nardò) la percentuale di olive infette è in media oramai al limite di tale soglia d'intervento.

Pertanto, compatibilmente con il periodo di carenza del prodotto utilizzato in funzione del periodo di raccolta programmato, si consiglia di intervenire sia sulle varietà a drupa grossa che sulle varietà tradizionali a drupa piccola che hanno raggiunto tale soglia d'intervento, ad eccezione, ovviamente, di chi ha già effettuato il trattamento nelle precedenti due-tre settimane.

Utilizzare, in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, Acetamiprid con numero massimo di trattamenti per singolo principio attivo secondo quanto previsto dalle norme di difesa integrata.

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
15/10/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 15/10/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

15/10/2018

Max 23
Min 16



Parzialmente soleggiato con temporali

16/10/2018

Max 22
Min 17



Nuvole intermittenti

17/10/2018

Max 23
Min 15



Nuvole intermittenti

18/10/2018

Min 15
Max 23



Parzialmente soleggiato

19/10/2018

Min 15
Max 24



Parzialmente soleggiato

//

Min
Max



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA




BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 14

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Lecce

PERIODO DI RILEVAZIONE: 09/10/2018 - 15/10/2018

PROVINCIA DI: TARANTO



Comprensorio: PIANURA DI TARANTO

CASTELLANETA
CRISPANO
FAGGIANO
GINOSA
GROTTAGLIE
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MARUGGIO
MASSAFRA
MONTEIASI
MONTEMESOLA
MOTTOLA
PALAGIANELLO
STATTE
TARANTO



Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Maturazione

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
PIANURA DI TARANTO	14,61	7,40	10 %	↓	


Suggerimenti Fitosanitari

Anche questa settimana il grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*Bractocera oleae*) rilevata dalla nostra attività di monitoraggio risulta di estremo rilievo con percentuale di punture fertili che in molti casi, in particolare sulle varietà a drupa grossa, raggiunge il 10% delle olive campionate.

Pertanto, compatibilmente con il periodo di carenza del prodotto utilizzato in funzione del periodo di raccolta programmato, si consiglia di intervenire sia sulle varietà a drupa grossa che sulle varietà tradizionali a drupa piccola che hanno raggiunto tale soglia d'intervento, ad eccezione, ovviamente, di chi ha già effettuato il trattamento nelle precedenti due-tre settimane.

Utilizzare, in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet, Acetamiprid con numero massimo di trattamenti per singolo principio attivo secondo quanto previsto dalle norme di difesa integrata.

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
15/10/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 15/10/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

15/10/2018

Max 23
Min 18



Parzialmente soleggiato con temporali

16/10/2018

Max 22
Min 18



Nuvole intermittenti

17/10/2018

Max 23
Min 16



Nuvole intermittenti

18/10/2018

Min 16
Max 24



Parzialmente soleggiato

19/10/2018

Min 16
Max 25



Nuvole intermittenti

//

Min
Max