Italia Olivicola
CONSORZIO NAZIONALE

APOL

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 16 MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA': 02/11/2020 - 07/11/2020



COMPRENSORIO - LE - PIANURA SALENTINA NORD

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
CAVALLINO
COPERTINO
LECCE
LIZZANELLO
MONTERONI DI LECCE
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TREPUZZI
VEGLIE
VERNOLE

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
RACCOLTA	28	7,8	10%	STAZIONARIO	ALTO

PREVISIONI METEO

02/11/2020	03/11/2020	04/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	07/11/2020	08/11/2020

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Dal nostro monitoraggio settimanale emerge che il grado d'infestazione della mosca dell'olivo (bractocera oleae) ha raggiunto sulla gran parte degli oliveti di tutte le varietà (sui quali non è stato effettuato il trattamento nelle precedenti 2-3 settimane), la soglia del 10% delle olive campionate.

Si consiglia nuovamente, ove possibile, di anticipare la raccolta; in alternativa, per chi non abbia già effettuato il trattamento nelle precedenti 2-3 settimane, di intervenire utilizzando esclusivamente prodotti e dosi nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida di difesa integrata 2020 previste dalla Regione Puglia secondo la tabella di seguito allegata.

Qualora si decidesse per l'intervento, si raccomanda di valutare con estrema attenzione se e con quale prodotto è possibile effettuare il trattamento, in considerazione del tempo di carenza del principio attivo da utilizzare rispetto alla data di raccolta prevista. Vi ricordiamo che la proroga all'utilizzo del principio attivo dimethoate è scaduta lo scorso 28 ottobre.

Italia Olivicola
CONSORZIO NAZIONALE

APOL

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 16 MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA': 02/11/2020 - 07/11/2020



COMPRENSORIO - LE - PIANURA SALENTINA SUD

ACQUARICA DEL CAPO
ALEZIO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
GALLIPOLI
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
MARTANO
MATINO
MELENDUGNO
MELISSANO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SALVE
SAN CASSIANO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
RACCOLTA	25	7,7	10%	STAZIONARIO	ALTO

PREVISIONI METEO

02/11/2020	03/11/2020	04/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	07/11/2020	08/11/2020

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Dal nostro monitoraggio settimanale emerge che il grado d'infestazione della mosca dell'olivo (bractocera oleae) ha raggiunto sulla gran parte degli oliveti di tutte le varietà (sui quali non è stato effettuato il trattamento nelle precedenti 2-3 settimane), la soglia del 10% delle olive campionate.

Si consiglia nuovamente, ove possibile, di anticipare la raccolta; in alternativa, per chi non abbia già effettuato il trattamento nelle precedenti 2-3 settimane, di intervenire utilizzando esclusivamente prodotti e dosi nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida di difesa integrata 2020 previste dalla Regione Puglia secondo la tabella di seguito allegata.

Qualora si decidesse per l'intervento, si raccomanda di valutare con estrema attenzione se e con quale prodotto è possibile effettuare il trattamento, in considerazione del tempo di carenza del principio attivo da utilizzare rispetto alla data di raccolta prevista. Vi ricordiamo che la proroga all'utilizzo del principio attivo dimethoate è scaduta lo scorso 28 ottobre.

Italia Olivicola
CONSORZIO NAZIONALE

APOL

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 16 MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA': 02/11/2020 - 07/11/2020



COMPRENSORIO - BR - COLLINA LITORANEA

BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
CELLINO SAN MARCO
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
ORIA
OSTUNI
SAN DONACI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
TORRE SANTA SUSANNA
VILLA CASTELLI
SAN GIORGIO IONICO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
RACCOLTA	32	8,2	10%	STAZIONARIO	ALTO

PREVISIONI METEO

02/11/2020	03/11/2020	04/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	07/11/2020	08/11/2020

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Dal nostro monitoraggio settimanale emerge che il grado d'infestazione della mosca dell'olivo (bractocera oleae) ha raggiunto sulla gran parte degli oliveti di tutte le varietà (sui quali non è stato effettuato il trattamento nelle precedenti 2-3 settimane), la soglia del 10% delle olive campionate.

Si consiglia nuovamente, ove possibile, di anticipare la raccolta; in alternativa, per chi non abbia già effettuato il trattamento nelle precedenti 2-3 settimane, di intervenire utilizzando esclusivamente prodotti e dosi nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida di difesa integrata 2020 previste dalla Regione Puglia secondo la tabella di seguito allegata.

Qualora si decidesse per l'intervento, si raccomanda di valutare con estrema attenzione se e con quale prodotto è possibile effettuare il trattamento, in considerazione del tempo di carenza del principio attivo da utilizzare rispetto alla data di raccolta prevista. Vi ricordiamo che la proroga all'utilizzo del principio attivo dimethoate è scaduta lo scorso 28 ottobre.

Mosca delle olive (Bactrocera oleae)	**SOGLIA DI INTERVENTO** • **Per le olive da tavola: quando si nota la presenza delle prime punture.** • **Per le olive da olio: in funzione delle varietà 10-15% di infestazione attiva (somma di uova e larve)** **INTERVENTI CHIMICI** Nelle olive da mensa anche la sola puntura può determinare deformazione della drupa, pertanto l'intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture. Nelle olive da olio effettuare interventi: • **Preventivi** (adulticidi) con esche proteiche avvelenate intervenendo alle primissime infestazioni o applicando il metodo "Attract and Kill" utilizzando trappole innescate con feromone e impregnate con Deltametrina o Lambdacialotrina o installando trappole per cattura massale. • **Curativi** nei confronti delle larve al superamento della soglia, intervenire nelle prime fasi di sviluppo della mosca (uovo e larva di 1° età).	*Opius concolor* *Beauveria Bassiana* **Pannelli attrattivi esche proteiche e sistemi tipo attract and kill** **Spinosad** **Dimetoato** carenza 28gg **Fosmet** carenza 21gg **Acetamiprid** carenza 21gg	Lanci da programmare con i centri di assistenza tecnica Solo formulato con specifica esca pronta all'uso Numero massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall' avversità Numero massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall' avversità (Non ammesso in agricoltura biologica) *Ammesso con deroga di 120 giorni Numero massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall' avversità (Si consiglia di acidificare con l'acqua) (Non ammesso in agricoltura biologica) Numero massimo 2 interventi all'anno. (Non ammesso in agricoltura biologica)