



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 1

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc.Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 06/06/2016 - 16/06/2016

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: **P.ra Salentina Centr**

ACQUARICA DEL CAPO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LECCE
LIZZANELLO
MARTANO
MARTIGNANO
MELENDUGNO
MINERVINO DI LECCE
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
RUFFANO
SANTA CESAREA TERME
SPONGANO
UGENTO
VERNOLE

Il Tecnico:
ALBERTO DANESE - Cell. 0832 51599

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
730100 Lecce
P IVA: 04416920751





Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Accrescimento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra Salentina Centr	29,62	3,16	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Nella verifica settimanale delle trappole attivate con feromone installate sui nostri campi di osservazione si riscontra la rilevante presenza di voli di adulti di tignola.

Tuttavia, il grado di infestazione attiva di uova e larve di tignola relativo ai campioni di olivette analizzate in laboratorio risultato ancora sotto la soglia d'intervento che pari al 10-15%.

Si consiglia un'attenta valutazione del proprio oliveto al fine di determinarne il picco di volo e soprattutto l'eventuale superamento della soglia d'intervento.

In tal caso intervenire impiegando preferibilmente principi attivi ecocompatibili quale Spinosad o il *Bacillus thuringiensis*, utilizzabili in agricoltura biologica o, in alternativa e solo per varietà a drupa grossa, prodotti a base di Dimetoato (max 1 trattamento)



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
16/06/2016

Tendenza della nuvolosità
fino al 21/06/2016

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

16/6/2016

Max 29
Min 23



Parzialmente nuvoloso

17/6/2016

Max 33
Min 21



Parzialmente nuvoloso

18/6/2016

Max 31
Min 21



Sereno

19/6/2016

Min 19
Max 29



Sereno

20/6/2016

Min 19
Max 29



Sereno

21/6/2016

Min 20
Max 30



Parzialmente nuvoloso



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 1

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.O.L. Soc.Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 06/06/2016 - 16/06/2016

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: P.ra di Lecce Nord

CAMPI SALENTINA
COPERTINO
LECCE
NARDO'
NOVOLI
SURBO
TREPuzzi
VEGLIE



Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.O.L. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
730100 Lecce
P IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Accrescimento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra di Lecce Nord	41,89	0,4	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Nella verifica settimanale delle trappole attivate con feromone installate sui nostri campi di osservazione si riscontra la rilevante presenza di voli di adulti di tignola.

Tuttavia, il grado di infestazione attiva di uova e larve di tignola relativo ai campioni di olivette analizzate in laboratorio risultato ancora sotto la soglia d'intervento che pari al 10-15%.

Si consiglia un'attenta valutazione del proprio oliveto al fine di determinarne il picco di volo e soprattutto l'eventuale superamento della soglia d'intervento.

In tal caso intervenire impiegando preferibilmente principi attivi ecocompatibili quale Spinosad o il *Bacillus thuringiensis*, utilizzabili in agricoltura biologica o, in alternativa e solo per varietà a drupa grossa, prodotti a base di Dimetoato (max 1 trattamento)



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
16/06/2016

Tendenza della nuvolosità
fino al 21/06/2016

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

16/6/2016

Max 29
Min 23



Parzialmente nuvoloso

17/6/2016

Max 33
Min 21



Parzialmente nuvoloso

18/6/2016

Max 31
Min 21



Sereno

19/6/2016

Min 19
Max 29



Sereno

20/6/2016

Min 19
Max 29



Sereno

21/6/2016

Min 20
Max 30



Parzialmente nuvoloso



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 1

MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc.Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 06/06/2016 - 16/06/2016

PROVINCIA DI: TARANTO



Comprensorio: **Pianura di Taranto**

CASTELLANETA
CRISPIANO
GINOSA
MASSAFRA
MOTTOLA
PALAGIANELLO



Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :
A.P.OL. Societ Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
730100 Lecce
P IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Accrescimento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA - Prays oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura di Taranto	19,93	1	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Nella verifica settimanale delle trappole attivate con feromone istallate sui nostri campi di osservazione si riscontra una discreta presenza di voli di adulti di tignola.

Tuttavia, il grado di infestazione attiva di uova e larve di tignola relativo ai campioni di olivette analizzate in laboratorio risultato ancora sotto la soglia d'intervento che pari al 10-15%.

Si consiglia un'attenta valutazione del proprio oliveto al fine di determinarne il picco di volo e soprattutto l'eventuale superamento della soglia d'intervento.

In tal caso intervenire impiegando preferibilmente principi attivi ecocompatibili quale Spinosad o il Bacillus thurigiensis, utilizzabili in agricoltura biologica o, in alternativa e solo per varietà a drupa grossa, prodotti a base di Dimetoato (max 1 trattamento)



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
16/06/2016

Tendenza della nuvolosità
fino al 21/06/2016

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

16/6/2016



Max 27
Min 23

Sereno

17/6/2016



Max 30
Min 21

Sereno

18/6/2016



Max 33
Min 21

Sereno

19/6/2016



Min 19
Max 31

Sereno

20/6/2016



Min 19
Max 31

Parzialmente nuvoloso

21/6/2016



Min 20
Max 32

Sereno