



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA



BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 2

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc.Coop. Lecce

PERIODO DI RILEVAZIONE: 16/07/2018 - 20/07/2018

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: P.ra di Lecce Nord

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
CAVALLINO
COPERTINO
LECCE
LIZZANELLO
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TORCHIAROLO
TREPUIZZI
VEGLIE



Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra di Lecce Nord	7,43	1,6	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari


Il grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) di questa settimana, rilevato dal monitoraggio sui nostri campi di osservazione, è il seguente:

Sulle varietà tradizionali a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), bassa percentuale di punture fertili sulle olivette e poche catture di adulti sulle trappole cromotropiche attivate con feromoni. Non si consiglia pertanto alcun trattamento fitosanitario.

Sulle varietà a drupa grossa la percentuale di attacco è di estremo rilievo con percentuali di infestazioni attive che superano il 10% delle olivette campionate. Pertanto, esclusivamente sulle varietà a drupa grossa e per chi non abbia già effettuato il trattamento nelle due-tre settimane precedenti, si consiglia un intervento fitosanitario utilizzando, anche per chi non sia in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet.

Si conferma anche questa settimana la diffusa ed estremamente rilevante presenza su molti campi di osservazione di punture di rinchite (*Rhynchites cribripennis*)

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
20/07/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 20/07/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

20/7/2018

Max 31
Min 21



Soleggiato

21/7/2018

Max 34
Min 23



Soleggiato

22/7/2018

Max 35
Min 24



Soleggiato

23/7/2018

Min 21
Max 31



Parzialmente soleggiato con temporali

24/7/2018

Min 23
Max 29



Parzialmente soleggiato

//

Min
Max

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 2

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc.Coop. Lecce

PERIODO DI RILEVAZIONE: 16/07/2018 - 20/07/2018

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: **P.ra Salentina Centro**
Sud

ACQUARICA DEL CAPO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
CAVALLINO
GALATINA
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LECCE
LIZZANELLO
MARTANO
MELENDUGNO

MELISSANO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SAN CASSIANO

SANARICA
SANTA CESAREA TERME
SCORRANO
SPONGANO
UGENTO



Il Tecnico:
FRANCESCO MARIANO - Cellulare: 3206389916

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra Salentina Sud	6,14	1,93	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari


Il grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) di questa settimana, rilevato dal monitoraggio sui nostri campi di osservazione, è il seguente:

Sulle varietà tradizionali a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), bassa percentuale di punture fertili sulle olivette e poche catture di adulti sulle trappole cromotropiche attivate con feromoni. Non si consiglia pertanto alcun trattamento fitosanitario.

Sulle varietà a drupa grossa la percentuale di attacco è di estremo rilievo con percentuali di infestazioni attive che superano il 10% delle olivette campionate. Pertanto, esclusivamente sulle varietà a drupa grossa e per chi non abbia già effettuato il trattamento nelle due-tre settimane precedenti, si consiglia un intervento fitosanitario utilizzando, anche per chi non sia in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet.

Si conferma anche questa settimana la diffusa ed estremamente rilevante presenza su molti campi di osservazione di punture di rinchite (*Rhynchites cribripennis*)

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
20/07/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 20/07/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

20/7/2018

Max 32
Min 19



Soleggiato

21/7/2018

Max 34
Min 23



Soleggiato

22/7/2018

Max 34
Min 23



Soleggiato

23/7/2018

Min 19
Max 32



Parzialmente soleggiato con temporali

24/7/2018

Min 21
Max 29



Parzialmente soleggiato

//

Min
Max



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

UNASCO


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 2

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc.Coop. Lecce

PERIODO DI RILEVAZIONE: 16/07/2018 - 20/07/2018

PROVINCIA DI: BRINDISI



Comprensorio: Collina Litoranea Br

BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
VILLA CASTELLI




Il Tecnico:
FEDERICO GALLONE - Cellulare: 3396517097

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Collina Litoranea Br	8,64	2,74	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari


Il grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) di questa settimana, rilevato dal monitoraggio sui nostri campi di osservazione, è il seguente:

Sulle varietà tradizionali a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), bassa percentuale di punture fertili sulle olivette e poche catture di adulti sulle trappole cromotropiche attivate con feromoni. Non si consiglia pertanto alcun trattamento fitosanitario.

Sulle varietà a drupa grossa la percentuale di attacco è di estremo rilievo con percentuali di infestazioni attiva che superano il 10% delle olivette campionate. Pertanto, esclusivamente sulle varietà a drupa grossa e per chi non abbia già effettuato il trattamento nelle due-tre settimane precedenti, si consiglia un intervento fitosanitario utilizzando, anche per chi non sia in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet.

Si conferma anche questa settimana la diffusa ed estremamente rilevante presenza su molti campi di osservazione di punture di rinchite (*Rhynchites cribripennis*)

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
20/07/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 20/07/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

20/7/2018

Max 31
Min 19



Soleggiato

21/7/2018

Max 34
Min 21



Soleggiato

22/7/2018

Max 36
Min 23



Caldo

23/7/2018

Min 20
Max 31



Parzialmente soleggiato con temporali

24/7/2018

Min 21
Max 28



Parzialmente soleggiato

//

Min
Max



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA




BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 2

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc.Coop. Lecce

PERIODO DI RILEVAZIONE: 16/07/2018 - 20/07/2018

PROVINCIA DI: TARANTO



Comprensorio: Pianura di Taranto

CASTELLANETA
CRISPIANO
GINOSA
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MASSAFRA
MOTTOLA
PALAGIANELLO



Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA



STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura di Taranto	4,55	1,82	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari


Il grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) di questa settimana, rilevato dal monitoraggio sui nostri campi di osservazione, è il seguente:

Sulle varietà tradizionali a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), bassa percentuale di punture fertili sulle olivette e poche catture di adulti sulle trappole cromotropiche attivate con feromoni. Non si consiglia pertanto alcun trattamento fitosanitario.

Sulle varietà a drupa grossa la percentuale di attacco è di estremo rilievo con percentuali di infestazioni attive che superano il 10% delle olivette campionate. Pertanto, esclusivamente sulle varietà a drupa grossa e per chi non abbia già effettuato il trattamento nelle due-tre settimane precedenti, si consiglia un intervento fitosanitario utilizzando, anche per chi non sia in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet.

Si conferma anche questa settimana la diffusa ed estremamente rilevante presenza su molti campi di osservazione di punture di rinchite (*Rhynchites cribripennis*)

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
20/07/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 20/07/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

20/7/2018

Max 34
Min 20



Soleggiato

21/7/2018

Max 34
Min 21



Soleggiato

22/7/2018

Max 34
Min 24



Soleggiato

23/7/2018

Min 20
Max 32



Nuvole intermittenti

24/7/2018

Min 23
Max 30



Parzialmente soleggiato

//

Min
Max