Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 3

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 25/06/2018 - 01/07/2018

PROVINCIA DI: LECCE

Comprensorio: P.ra di Lecce Nord

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
CAVALLINO
COPERTINO
LECCE
LIZZANELLO
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TORCHIAROLO
TREPUZZI
VEGLIE

Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Indurimento nocciolo

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra di Lecce Nord	52,1	1,98	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

La percentuale d'infestazione di **Tignola (prays oleae)** riscontrata a seguito del monitoraggio settimanale sui nostri campi di osservazione è ancora sotto la soglia d'intervento, con presenza di adulti in diminuzione rispetto alla settimana precedente e attività ovideponente ampiamente sotto il 10% delle olive attaccate sulla varietà da olio. Non si consiglia pertanto alcun trattamento fitosanitario. Peraltro si rileva che, in alcuni contesti e su alcune varietà, ci si trova nella fase iniziale di indurimento nocciolo

I nostri tecnici, a seguito dei loro campionamenti, rilevano che è in atto in molte zone del comprensorio ed esclusivamente sulle varietà a drupa grossa, un forte attacco iniziale di **Mosca (Bractocera oleae)** con presenza di uova e larve di primo stadio e con percentuali di infestazione attiva che supera ampiamente il 10% delle olivette attaccate; le varietà a drupa piccola risultano invece al momento non attaccate.

Tale attacco anticipato si spiega molto probabilmente con lo stadio fenologico della drupa più avanzato rispetto al periodo e causato dall'andamento climatico anomalo di queste ultime settimane caratterizzato da piogge intense e ripetute.

Esclusivamente sulle varietà a drupa grossa si consiglia pertanto di effettuare un intervento chimico utilizzando, anche per chi non fosse in regime di agricoltura biologica, preferibilmente tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet.

Di estrema rilevanza risulta anche la presenza, su molti campi di osservazione, di Rinchite (rhinchites cribripennis).

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 02/07/2018

Tendenza della nuvolosità fino al 06/07/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

2/7/2018	3/7/2018	4/7/2018
Max 30 Min 21	Max 31 Min 21	Max 30 Min 20
Soleggiato	Soleggiato	Soleggiato

5/7/2018	6/7/2018	//
Min 21 Max 32	Min 22 Max 31	Min Max
Soleggiato	Prevalentemente soleggiato	

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 3

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 25/06/2018 - 01/07/2018

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: P.ra Salentina Centro Sud

ACQUARICA DEL CAPO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
CAVALLINO
GALATINA
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LECCE
LIZZANELLO
MARTANO
MELENDUGNO
MELISSANO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SAN CASSIANO
SANARICA
SANTA CESAREA TERME
SCORRANO
SPONGANO
UGENTO

Il Tecnico:
FRANCESCO MARIANO - Cellulare: 3206389916

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Indurimento nocciolo

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra Salentina Sud	61,2	2,5	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

La percentuale d'infestazione di **Tignola (prays oleae)** riscontrata a seguito del monitoraggio settimanale sui nostri campi di osservazione è ancora sotto la soglia d'intervento, con presenza di adulti in diminuzione rispetto alla settimana precedente e attività ovideponente ampiamente sotto il 10% delle olive attaccate sulla varietà da olio. Non si consiglia pertanto alcun trattamento fitosanitario. Peraltro si rileva che, in alcuni contesti e su alcune varietà, ci si trova nella fase iniziale di indurimento nocciolo

I nostri tecnici, a seguito dei loro campionamenti, rilevano che è in atto in molte zone del comprensorio ed esclusivamente sulle varietà a drupa grossa, un forte attacco iniziale di **Mosca (Bractocera oleae)** con presenza di uova e larve di primo stadio e con percentuali di infestazione attiva che supera ampiamente il 10% delle olivette attaccate; le varietà a drupa piccola risultano invece al momento non attaccate.

Tale attacco anticipato si spiega molto probabilmente con lo stadio fenologico della drupa più avanzato rispetto al periodo e causato dall'andamento climatico anomalo di queste ultime settimane caratterizzato da piogge intense e ripetute.

Esclusivamente sulle varietà a drupa grossa si consiglia pertanto di effettuare un intervento chimico utilizzando, anche per chi non fosse in regime di agricoltura biologica, preferibilmente tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet.

Di estrema rilevanza risulta anche la presenza, su molti campi di osservazione, di Rinchite (rhinchites cribripennis).

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 02/07/2018

Tendenza della nuvolosità fino al 06/07/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

2/7/2018	3/7/2018	4/7/2018
Max 30 Min 20	Max 31 Min 21	Max 30 Min 20
Soleggiato	Soleggiato	Soleggiato

5/7/2018	6/7/2018	//
Min 20 Max 32	Min 21 Max 31	Min Max
Soleggiato	Prevalentemente soleggiato	

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 3

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 25/06/2018 - 01/07/2018

PROVINCIA DI: BRINDISI



Comprensorio: Collina Litoranea Br

CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
VILLA CASTELLI

Il Tecnico:
FEDERICO GALLONE - Cellulare: 3396517097

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Indurimento nocciolo

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Collina Litoranea Br	55,4	2,1	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

La percentuale d'infestazione di **Tignola (prays oleae)** riscontrata a seguito del monitoraggio settimanale sui nostri campi di osservazione è ancora sotto la soglia d'intervento, con presenza di adulti in diminuzione rispetto alla settimana precedente e attività ovideponente ampiamente sotto il 10% delle olive attaccate sulla varietà da olio. Non si consiglia pertanto alcun trattamento fitosanitario. Peraltro si rileva che, in alcuni contesti e su alcune varietà, ci si trova nella fase iniziale di indurimento nocciolo

I nostri tecnici, a seguito dei loro campionamenti, rilevano che è in atto in molte zone del comprensorio ed esclusivamente sulle varietà a drupa grossa, un forte attacco iniziale di **Mosca (Bractocera oleae)** con presenza di uova e larve di primo stadio e con percentuali di infestazione attiva che supera ampiamente il 10% delle olivette attaccate; le varietà a drupa piccola risultano invece al momento non attaccate.
Tale attacco anticipato si spiega molto probabilmente con lo stadio fenologico della drupa più avanzato rispetto al periodo e causato dall'andamento climatico anomalo di queste ultime settimane caratterizzato da piogge intense e ripetute.

Esclusivamente sulle varietà a drupa grossa si consiglia pertanto di effettuare un intervento chimico utilizzando, anche per chi non fosse in regime di agricoltura biologica, preferibilmente tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet.

Di estrema rilevanza risulta anche la presenza, su molti campi di osservazione, di Rinchite (rhinchites cribripennis).

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 02/07/2018

Tendenza della nuvolosità fino al 06/07/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

2/7/2018	3/7/2018	4/7/2018
Max 32 Min 20	Max 31 Min 21	Max 31 Min 21
Soleggiato	Parzialmente soleggiato	Soleggiato

5/7/2018	6/7/2018	//
Min 21 Max 33	Min 21 Max 31	Min Max
Soleggiato	Prevalentemente soleggiato	

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 3

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 25/06/2018 - 01/07/2018

PROVINCIA DI: TARANTO



Comprensorio: Pianura di Taranto

CASTELLANETA
CRISPIANO
GINOSA
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MASSAFRA
MOTTOLA
PALAGIANELLO

Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO: Indurimento nocciolo

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura di Taranto	62,4	2,3	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

La percentuale d'infestazione di **Tignola (prays oleae)** riscontrata a seguito del monitoraggio settimanale sui nostri campi di osservazione è ancora sotto la soglia d'intervento, con presenza di adulti in diminuzione rispetto alla settimana precedente e attività ovideponente ampiamente sotto il 10% delle olive attaccate sulla varietà da olio. Non si consiglia pertanto alcun trattamento fitosanitario. Peraltro si rileva che, in alcuni contesti e su alcune varietà, ci si trova nella fase iniziale di indurimento nocciolo

I nostri tecnici, a seguito dei loro campionamenti, rilevano che è in atto in molte zone del comprensorio ed esclusivamente sulle varietà a drupa grossa, un forte attacco iniziale di **Mosca (Bractocera oleae)** con presenza di uova e larve di primo stadio e con percentuali di infestazione attiva che supera ampiamente il 10% delle olivette attaccate; le varietà a drupa piccola risultano invece al momento non attaccate.

Tale attacco anticipato si spiega molto probabilmente con lo stadio fenologico della drupa più avanzato rispetto al periodo e causato dall'andamento climatico anomalo di queste ultime settimane caratterizzato da piogge intense e ripetute.

Esclusivamente sulle varietà a drupa grossa si consiglia pertanto di effettuare un intervento chimico utilizzando, anche per chi non fosse in regime di agricoltura biologica, preferibilmente tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet.

Di estrema rilevanza risulta anche la presenza, su molti campi di osservazione, di Rinchite (rhinchites cribripennis).

Consorzio Nazionale degli Olivicoltori

CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA

PREVISIONI METEREOLOGICHE

Situazione delle temperature in Italia al 02/07/2018

Tendenza della nuvolosità fino al 06/07/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

2/7/2018	3/7/2018	4/7/2018
Max 31 Min 21	Max 33 Min 21	Max 32 Min 21
Soleggiato	Parzialmente soleggiato	Prevalentemente soleggiato

5/7/2018	6/7/2018	//
Min 22 Max 33	Min 23 Max 34	Min Max
Soleggiato	Prevalentemente soleggiato	