



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA



BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 3

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 21/07/2018 - 27/07/2018

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: P.ra di Lecce Nord

ARNESANO
CAMPI SALENTINA
CAVALLINO
COPERTINO
LECCE
LIZZANELLO
NARDO'
NOVOLI
SALICE SALENTINO
SURBO
TORCHIAROLO
TREPUIZZI
VEGLIE



Il Tecnico:
ANTONIO MARTELLA - Cellulare: 3382193584

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra di Lecce Nord	5,16	2,89	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il monitoraggio di questa settimana effettuato sui nostri campi di osservazione rileva il seguente grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*bractocera oleae*):


Sulle varietà tradizionali a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), poche catture di adulti sulle trappole cromotropiche attivate con feromoni e percentuale di punture fertili sulle olivette ancora al di sotto della soglia d'intervento. Non si consiglia pertanto alcun trattamento fitosanitario.

Sulle varietà a drupa grossa, malgrado il numero di catture di adulti sia relativamente basso, la percentuale di attacco è di estremo rilievo con percentuali di infestazioni attiva che hanno raggiunto il 10% delle olivette campionate. Su oliveti dove nelle precedenti settimane non è stato effettuato il trattamento si notano olive attaccate con uova e larve di varia età e fori di uscita che dimostrano che sono in atto accavallamenti di generazioni dell'insetto.

Pertanto, esclusivamente sulle varietà a drupa grossa e per chi non abbia già effettuato il trattamento nelle due-tre settimane precedenti, si consiglia un intervento fitosanitario utilizzando, anche per chi non sia in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet.

Si conferma anche questa settimana la diffusa ed estremamente rilevante presenza su molti campi di osservazione di punture di rinchite (*rhinchites cribripennis*)

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
27/07/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 27/07/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

27/7/2018



Max 31
Min 20

Parzialmente soleggiato

28/7/2018



Max 31
Min 21

Soleggiato

29/7/2018



Max 31
Min 24

Prevalentemente nuvoloso

30/7/2018



Min 25
Max 32

Prevalentemente soleggiato

31/7/2018



Min 24
Max 32

Parzialmente soleggiato

//

Min
Max

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 3

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 21/07/2018 - 27/07/2018

PROVINCIA DI: LECCE



Comprensorio: P.ra Salentina Centro
Sud

ACQUARICA DEL CAPO
CANNOLE
CARPIGNANO SALENTINO
CASARANO
CAVALLINO
GALATINA
GIUGGIANELLO
GIURDIGNANO
LECCE
LIZZANELLO
MARTANO
MELENDUGNO

MELISSANO
MINERVINO DI LECCE
NOCIGLIA
OTRANTO
PALMARIGGI
POGGIARDO
PRESICCE
RUFFANO
SAN CASSIANO

SANARICA
SANTA CESAREA TERME
SCORRANO
SPONGANO
UGENTO



Il Tecnico:
FRANCESCO MARIANO - Cellulare: 3206389916

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
P.ra Salentina Sud	7,54	3,49	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il monitoraggio di questa settimana effettuato sui nostri campi di osservazione rileva il seguente grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*bractocera oleae*):


Sulle varietà tradizionali a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), poche catture di adulti sulle trappole cromotropiche attivate con feromoni e percentuale di punture fertili sulle olivette ancora al di sotto della soglia d'intervento. Non si consiglia pertanto alcun trattamento fitosanitario.

Sulle varietà a drupa grossa, malgrado il numero di catture di adulti sia relativamente basso, la percentuale di attacco è di estremo rilievo con percentuali di infestazioni attiva che hanno raggiunto il 10% delle olivette campionate. Su oliveti dove nelle precedenti settimane non è stato effettuato il trattamento si notano olive attaccate con uova e larve di varia età e fori di uscita che dimostrano che sono in atto accavallamenti di generazioni dell'insetto.

Pertanto, esclusivamente sulle varietà a drupa grossa e per chi non abbia già effettuato il trattamento nelle due-tre settimane precedenti, si consiglia un intervento fitosanitario utilizzando, anche per chi non sia in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet.

Si conferma anche questa settimana la diffusa ed estremamente rilevante presenza su molti campi di osservazione di punture di rinchite (*rhinchites cribripennis*)

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
27/07/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 27/07/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

27/7/2018



Max 31
Min 21

Parzialmente soleggiato

28/7/2018



Max 31
Min 20

Soleggiato

29/7/2018



Max 31
Min 23

Nuvole intermittenti

30/7/2018



Min 23
Max 32

Prevalentemente soleggiato

31/7/2018



Min 23
Max 32

Parzialmente soleggiato

//

Min
Max



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA



BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 3

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 21/07/2018 - 27/07/2018

PROVINCIA DI: BRINDISI



Comprensorio: Collina Litoranea Br

BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
OSTUNI
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
VILLA CASTELLI




Il Tecnico:
FEDERICO GALLONE - Cellulare: 3396517097

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Collina Litoranea Br	8,64	7,84	10 %	↓	

Suggerimenti Fitosanitari

Il monitoraggio di questa settimana effettuato sui nostri campi di osservazione rileva il seguente grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*):


Sulle varietà a drupa grossa, malgrado il numero di catture di adulti sia relativamente basso, la percentuale di attacco è di estremo rilievo con percentuali di infestazioni attive che superano il 10% delle olivette campionate. Su oliveti dove nelle precedenti settimane non è stato effettuato il trattamento si notano olive attaccate con presenza di uova, larve di vario stadio di età e fori di uscita che dimostrano che sono in atto accavallamenti di generazioni dell'insetto.

Sulle varietà tradizionali a drupa piccola (oglierola salentina), malgrado il numero di catture di adulti sia di scarso rilievo, il grado d'infestazione rilevato ha raggiunto la percentuale del 10% delle olive da olio campionate.

Pertanto, si consiglia un intervento fitosanitario utilizzando, anche per chi non sia in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoate, Imidacloprid, Fosmet.

Si conferma anche questa settimana la diffusa ed estremamente rilevante presenza su molti campi di osservazione di punture di rinchite (*Rhynchites cribripennis*)

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
27/07/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 27/07/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

27/7/2018

Max 30
Min 20



Parzialmente soleggiato con temporali

28/7/2018

Max 30
Min 21



Soleggiato

29/7/2018

Max 30
Min 24



Prevalentemente nuvoloso

30/7/2018

Min 24
Max 31



Soleggiato

31/7/2018

Min 24
Max 31



Prevalentemente soleggiato

//

Min
Max



Consorzio Nazionale degli Olivicoltori



CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELL'ITALIA



BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 3

MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI: A.P.OL. Soc. Coop. Agr.

PERIODO DI RILEVAZIONE: 21/07/2018 - 27/07/2018

PROVINCIA DI: TARANTO



Comprensorio: Pianura di Taranto

CASTELLANETA
CRISPIANO
GINOSA
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MASSAFRA
MOTTOLA
PALAGIANELLO



Il Tecnico:
GRAZIANO SCARANO - Cellulare: 3495132129

O.P. :
A.P.OL. Società Cooperativa Agricola
Organizzazione tra Produttori Olivicoli
Via Zanardelli, 99
73100 Lecce
P.IVA: 04416920751

STADIO FENOLOGICO DELL'OLIVO:

Ingrossamento drupe

RISULTATO DEL MONITORAGGIO MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
Pianura di Taranto	5,33	2,5	10 %	=	

Suggerimenti Fitosanitari

Il monitoraggio di questa settimana effettuato sui nostri campi di osservazione rileva il seguente grado d'infestazione di mosca dell'olivo (*bractocera oleae*):


Sulle varietà tradizionali a drupa piccola (cellina di Nardò e ogliarola salentina), poche catture di adulti sulle trappole cromotropiche attivate con feromoni e percentuale di punture fertili sulle olivette ancora al di sotto della soglia d'intervento. Non si consiglia pertanto alcun trattamento fitosanitario.

Sulle varietà a drupa grossa, malgrado il numero di catture di adulti sia relativamente basso, la percentuale di attacco è di estremo rilievo con percentuali di infestazioni attiva che hanno raggiunto il 10% delle olivette campionate. Su oliveti dove nelle precedenti settimane non è stato effettuato il trattamento si notano olive attaccate con uova e larve di varia età e fuori di uscita che dimostrano che sono in atto accavallamenti di generazioni dell'insetto.

Pertanto, esclusivamente sulle varietà a drupa grossa e per chi non abbia già effettuato il trattamento nelle due-tre settimane precedenti, si consiglia un intervento fitosanitario utilizzando, anche per chi non sia in regime di agricoltura biologica, tecniche e/o prodotti ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet.

Si conferma anche questa settimana la diffusa ed estremamente rilevante presenza su molti campi di osservazione di punture di rinchite (*rhinchites cribripennis*)

PREVISIONI METEOREOLOGICHE



Situazione delle
temperature in Italia al
27/07/2018

Tendenza della nuvolosità
fino al 27/07/2018

I dati che seguono sono riferiti alla zona di monitoraggio

27/7/2018



Max 32
Min 21

Parzialmente soleggiato

28/7/2018



Max 32
Min 21

Prevalentemente soleggiato

29/7/2018



Max 33
Min 24

Temporali

30/7/2018



Min 25
Max 34

Prevalentemente soleggiato

31/7/2018



Min 24
Max 34

Prevalentemente soleggiato

//

Min
Max